



32. Zatiranje plevelov v krompirju - 11.04.2024 17:20 - Zaključeno



Ob otoplitvi vremena v zadnjem tednu je sajenje krompirja te dni polnem teku. Pred vznikom krompirja, ko se zemlja dovolj usede, je čas za zatiranje plevelov s katerim od talnih herbicidov, ki so navedeni v spodnji tabeli.

Pred škropljenjem natančno preberite in upoštevajte sredstvom priložena navodila!

Herbicid	Odmerek L, kg/ha	Aktivna snov	Opombe
Raba pred vznikom krompirja			
Stomp Aqua	2,9	pendimetalin	- za zatiranje enoletnega ozkolistnega in nekatere širokolistne plevela - škropiti po sajenju, ko se tla sesedejo - za dobro učinkovitost je potrebna zadostna talna vlaga!
Sharpen 33 EC	3-5		
Sharpen plus 40 SC	2,5-4		
Stallion sync tec	3	pendimetalin + klomazon	- za zatiranje enoletnega ozkolistnega in širokolistnega plevela ter plazeče pinnice - škropiti čimprej po sajenju, ko se tla sesedejo - ni za semenski krompir!
Boxer	5	prosulfokarb	- za zatiranje ozkolistnega in širokolistnega plevela - tretirati po sajenju in tik pred vznikom krompirja (po zadnji obdelavi grebenov)
Plateen WG 41,5	2-2,5	metribuzin + flufenacet	talni in folijski (listni) herbicid po vzniku plevela za zatiranje enoletnega ozkolistnega in širokolistnega plevela
Metric	1-1,5	klomazon + metribuzin	za zatiranje enoletnega ozkolistnega in širokolistnega plevela
Angelus	0,25	klomazon	- za zatiranje enoletnega širokolistnega
Clomate			
Clomate			- najpozneje 7 dni po sajenju
Proman	3	metobromuron	- za zatiranje nekaterih enoletnih širokolistnih in ozkolistnih plevelov - za srednje pozne in pozne sorte krompirja
Sinopia	3	klomazon + metobromuron	- za zatiranje nekaterih enoletnih širokolistnih plevelov in omejevanje številčnosti navadne kostrebe - škropiti takoj po sajenju (do 5 dni po sajenju) - v neugodnih razmerah (pomanjkanje vlage v tleh, zmrzal, obilne padavine na lahkih tleh) možnost fitotoksičnega delovanja
Challenge, Challenge 600,	3-4	aklonifen	- za zatiranje širokolistnega in ozkolistnega plevela - za dobro delovanje je potrebna vlaga v tleh

Chanon			
Raba pred vznikom ali kmalu po vzniku krompirja			
Sencor SC 600, Buzzin	0,15- 0,75	metribuzin	• nekatere sorte krompirja so občutljive

Datum objave obvestila: 11.04.2024 17:20
Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: Urbančič Zemljič Meta
Pripravili: **Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt**
[Seznam registriranih FFS](#)

