

29. OBVESTILO O ZATIRANJU PLEVELOV V KORUZI - 12.04.2024 07:24 - Zaključeno



Setev korusa se je v SV Sloveniji pričela že v ob koncu preteklega tedna. Plevela v korusi je mogoče zatirati **pred vznikom ali po vzniku**, najkasneje do faze osmih listov. Za dobro delovanje herbicidov je potrebno dobro pripraviti tla. Talni herbicidi potrebujejo za dobro delovanje **dovolj talne vlage**. Pred uporabo posameznih herbicidov je potrebno upoštevati **razvojno fazo plevelnih vrst in korusa**.

Pidelovalci, ki kmetujete na najožjem vodovarstvenem območju-VVOI in ste vključeni v ukrepe Vodni viri, Ohranjanje kolobarja – stopnja III in Varovalni pasovi ob vodotokih intervencije IRP 18.02 Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila – Naravni viri (KOPOP – Naravni viri) iz Strateškega načrta SKP 2023–2027 upoštevajte prepovedane herbicide za to območja in izberite herbicid iz seznama dovoljenih.

Preglednica: Seznam registriranih herbicidov za koruso

Pripravek	Odmerek	Fenološka faza uporabe	Za zatiranje naslednjih plevelov:
PREPOVEDANI HERBICIDI NA OBMOČJU VVOI			
Akris (terbutilazin 25%+ dimetenamid-P28%) Prepovedan na VVOI in za vključene v KOPOP.	3 l/ha	Tretiranje se izvede po vzniku, ko ima korusa od dva do šest listov (BBCH 12-16), pleveli pa največ dva lista. Sredstvo uporabljeno v času, ko imajo pleveli razvita več kot dva lista, ne daje zadostne učinkovitosti. Iz tega razloga je škroplilni mešanici treba dodati ustrezen herbicid, ki bo zagotovil zatiranje teh plevelov.	Sredstvo zatira številne ozkolistne in širokolistne plevela , predvsem pa: navadno kostrebo, krvavordečo srakonjo, laški muhvič, enoletno latovko, dresni, navadno loboda, pasje zelišče, enoletni golšec, kamilico, belo metliko, mnogosemenska metlika, njivsko vijolico, navadno zvezdico, navadni ščir in drobnocvetni rogovilček. Sredstvo zmanjšuje zapleveljenost s: pimico, njivskim slakom in navadnim plotnim slakom.
Primextra TZ Gold 500 SC (terbutilazin 18,75%+ metolaklor-S 31,25%) Prepovedan na VVOI in za vključene v KOPOP. Poraba zalog do 23.7. 2024	4 – 4,5 l/ha	Pred vznikom korusa izven VVO ali po vzniku korusa in plevelov.	Za zatiranje enoletnega ozkolistnega in širokolistnega plevela njivni lisičji rep, ščire, njivsko kurjo češnjico, navadni plešec, metlike, navadni kristavec, malo srakonjo, krvavordečo srakonjo, navadno kostrebo, navadno rosnico, navadni zebrat, drobnocvetni rogovilček, mrtve koprive, kamilice, proso, ptičjo dresen, breskovo dresen, navadni tolščak, njivsko redkev, muhviče, navadni grint, gorjušice, pasje zelišče, čišljake, navadno zvezdico, njivski mošnjak, jetičnike, grašice, divjo vijolico in druge. Dobro deluje tudi na baržunasti oslez, navadno ambrozijo, loboda, ostrice, mlečke, plezajoča lakota, madronščice, navadni slezenovec, trpotce, škrbinke ter pisani serek in divji serek iz semena.
Koban TX (terbutilazin 18,75%+ petoksamid 30%) Prepovedan na VVOI in za vključene v KOPOP..	4 l/ha	Plevel se tretira od razvojne faze pred vznikom korusa do razvojne faze, ko koleoptila prodre iz zemlje (BBCH 00-09), ali po vzniku korusa, od razvojne faze korusa, ko prvi list prodre skozi koleoptilo, do faze ko	Sredstvo zelo dobro deluje na naslednje plevela: srhkodlakavi ščir, navadna loboda, navadni plešec, bela metlika, navadna kostreba, plezajoča lakota, drobnocvetni rogovilček, pritlična krvomočnica, njivska mrtva kopriva, škrlatnordeča mrtva kopriva, nediščica trirobka, morska kamilica, enoletna latovka, navadni slakovec, ščavjelstna dresen, breskova dresen, zeleni muhvič,

		so 4 listi razviti (BBCH 10-14).	navadna zvezdica, njivski mošnjak, perzijski jetičnik in njivska vijolica. Sredstvo slabo deluje na naslednje plevel: njivski slak, plazeča pirnica in pasje zelišče.
Calaris pro (terbutilazin 32,6%+ mezotrion 5 %) Prepovedan na VVOI in za vključene v KOPOP.	v odmerku 2,0-2,3 L/ha pri porabi vode 200-400 L/ha.	Sredstvo se lahko uporablja po setvi, pred vznikom koruze ali po vzniku koruze do razvojne faze, ko je razvit 4. list (BBCH 00-14). Tretiranje se mora izvesti s šobami s ploščatim curkom, na dobro pripravljena vlažna tla, brez grud in brez skorje.	Za zatiranje enoletnega širokolistnega in nekaterih vrst ozkolistnega plevela v koruzi. Sredstvo v odmerku 2,0-2,3 L/ha zatira naslednje širokolistne plevel: baržunasti oslez, ščiri, pelinolistna ambrozija, navadni plešec, metlike, navadni kristavec, navadna sončnica, navadni oslez, kamilice, enoletni golšček, navadni slakovec, breskova dresen, navadni tolščak, njivska gorjušica, pasje zelišče in bodič. Sredstvo v odmerku 2,3 L/ha zmanjšuje zapleveljenost z naslednjimi ozkolistnimi pleveli: krvavordeča srakonja, navadna kostreba, divje proso, golo proso in muhviči. Zaradi boljšega delovanja sredstva na ozkolistne plevel in plevel, ki pozno vzniknejo, se priporoča uporabo sredstva po vzniku koruze. Zaradi izboljšanja delovanja na našete ozkolistne plevel in razširitev delovanja na druge vrste ozkolistnega plevela se lahko sredstvu po predhodnem posvetu z zastopnikom doda ustrezen graminicid. Nižji odmerek sredstva 2,0 L/ha se priporoča na površinah z manjšo zapleveljenostjo.
Dual gold 960 EC Efica 960 EC (metolaklor-S 96%) Prepovedan na VVOI in za vključene v KOPOP. Poraba zalog do 23.7. 2024	1 – 1,5 l/ha	Po setvi pred vznikom izven VVO, ali po vzniku.	Za zatiranje enoletnega ozkolistnega in širokolistnega plevela in zatira navadno kostrebo, krvavordečo srakonjo, malo srakonjo, sivozelene muhvič, zeleni muhvič, vretenčasti muhvič, golo proso, navadno zvezdico in drobnocvetni rogovilek. Srednje dobro zatira užitno ostrico, divji sirek iz semena, navadni plešec, ščire in navadni tolščak.
Lumax (mezotrion 3,75 %+ S-metolaklor 37,5%+ Terbutilazin 12,5%) Lumax H 537,5 (mezotrion 3,75%+ S-metolaklor 31,25%+ Terbutilazin 18,75%) Prepovedan na VVOI in za vključene v KOPOP. Poraba zalog do 23.7. 2024	3 – 4 l/ha	Po setvi pred vznikom koruze izven VVO ali po vzniku koruze do 4 listov. Ko ima ozkolistni plevel največ 3 liste.	Za zatiranje enoletnega ozkolistnega in širokolistnega plevela. Sredstvo zatira naslednje širokolistne plevel v odmerku 3,0 L/ha: baržunasti oslez, ščire, navadno ambrozijo, (samosevno) ogrščico, navadni plešec, metlike, navadni kristavec, navadni čapljevec, drobnocvetni rogovilek, plezajočo lakoto, mrtve koprive, breskovo dresen, njivsko gorjušico, pasje zelišče in navadno zvezdico. Sredstvo zatira naslednje širokolistne plevel v odmerku 4,0 L/ha (poleg zgoraj navedenih): njivski slak, kamilice, poljski mak, navadni slakovec, ptičje dresen, navadni tolščak, navadni bodič, njivski mošnjak, jetičnike ter vijolice. Za učinkovitejše zatiranje ptičje dresni se priporoča tretiranje pred vznikom koruze. Za učinkovitejše zatiranje navadnega tolščaka se priporoča tretiranje takoj po vzniku koruze. Sredstvo zatira naslednje ozkolistne plevel v odmerku 4,0 L/ha: krvavordečo srakonjo, navadno kostrebo ter golo proso in navadno proso. Za učinkovitejše zatiranje sivozelenega muhviča se priporoča tretiranje pred vznikom koruze. Sredstvo zmanjšuje zapleveljenost naslednjih ozkolistnih plevelov v odmerku 4,0 L/ha: plazeče pirnice in muhvičev. Sredstvo v odmerku 4,0 L/ha zelo slabo zatira divji sirek.
			Pri slaku je optimalen čas zatiranja, ko so

Banvel 480 S Dicash Kalimba Kamba 480 SL Mural (dikamba 48%) Prepovedan na VVOI in za vključene v KOPOP.	0,6 l/ha	v razvojni fazi, ko imata koruza oziroma sirek razvitih 2 do 8 listov (BBCH 12-18). Najboljše rezultate se doseže, če se koruzo in sirek tretira, ko imata razvita 3-5 listov, pleveli pa 2-4 prave liste.	poganjki dolgi 5-15 cm, pri osatu pa, ko ima leta 4-6 listov. Če se sredstvo uporablja, ko imata koruza oziroma sirek več kot 6 listov, se mora v tem primeru tretirati usmerjeno pod liste koruze oziroma sirka. Sredstvo zatira naslednje enoletne pleveli: navadna kurja češnjica, ščir, metlika in dresen. Sredstvo zatira naslednje večletne pleveli: plotni slak, osat, slak in kislica.
Arrat + močilo DASH (dikamba 50% + tritosulfuron 25%) Prepovedan na VVOI in za vključene v KOPOP.	0,2 kg/ha	Po vzniku koruze do 2-8 listov BBCH 12-18.	Enoletni in večletni širokolistni pleveli: baržunasti oslez, ščir, njivska pasja kamilica, navadni plešec, bela metlika, setvena krizantema, vrtna krizantema, njivski osat, navadni plotni slak, njivski slak, ostrožnik, navadni kristavec, navadna rosnica, zebnat, plezajoča lakota, njivska mrtva kopriva, prava kamilica, nediščeča trirobka, njivski mak, srhkolistna skrka, ptičja dresen, navadni slakovec, navadni tolščak, plazeča zlatca, njivska redkev, kalijeva solinka, lepnica, njivska gorjušica, bela gorjušica, navadna škrbinka, navadna zvezdica, bršljanovolistni jetičnik, perzijski jetičnik, navadni bodič; zmanjšuje zapleveljenost na: pasje zelišče, žarkasta dvoglavka.
Callam (dikamba 48% + tritosulfuron 12,5%) Prepovedan na VVOI in na NUV za vključene v KOPOP.	300 g/ha + močilo DASH HC v odmerku 0,8-1,0 L/ha.	v fenološki fazi od treh do šestih razvitih listov (BBCH 13-16)	Sredstvo se uporablja za zatiranje enoletnega in večletnega širokolistnega plevla v koruzi po vzniku. Sredstvo se uporablja za zatiranje: golega ščira, navadnega ščira, bele metlike, navadnega kristavca, navadnega osleza, njivske gorjušice in bodiča.
Basagran 480 (bentazon 48%) Prepovedan na VVOI in za vključene v KOPOP.	1,5 - 2 l/ha	Po vzniku koruze do 1 – 6 listov , BBCH 11 – 16.	Sredstvo dobro zatira: njivsko pasjo kamilico, navadni plešec,ščavjelistno dresen, metlike,pasje zelišče,njivsko redkev, njivski mošnjak,kamilice in belo gorjušico. Sredstvo slabše zatira: navadni slakovec, poprasto dresen, breskovo dresen, samoniklo oljno ogrščico, njivsko gorjušico, navadno zvezdico, njivsko spominčico in plezajočo lakoto . Sredstvo ne zatira zadovoljivo poljskega maka in jetičnika.
Beni (bentazon 87%) Prepovedan na VVOI in za vključene v KOPOP.	1 l/ha	Po vzniku koruze do 4 – 8 listov , BBCH 14 – 18.	Sredstvo BENI učinkovito zatira belo metliko (<i>Chenopodium album</i>) in pasje zelišče (<i>Solanum nigrum</i>) ter zmanjšuje zapleveljenost s samosevno oljno ogrščico (<i>Brassica napus</i>), navadno zvezdico (<i>Stellaria media</i>) in breskovo dresnijo (<i>Persicaria maculosa</i>).
Lontrel 72 SG (klopiralid 72%) Prepovedan na VVOI in za vključene v KOPOP.	0,17 kg/ha	v razvojni fazi od razvitih 2 do 9 pravih listov (BBCH 12-19);	Zatira naslednje plevelne vrste: bodič, pravo kamilico, nediščečo trirobko, druge vrste kamilic, njivsko pasjo kamilico, njivski osat in druge vrste osatov. Sredstvo lahko slabše deluje na osate, če so le ti v času tretiranja v stresu zaradi suše.
Aliseo plus (dikamba 60,52%+ nikosulfuron 9,2%+ rinsulfuron 2,3%) z dodatkom močila TREND 90 Rinidi WG	350-440 g/ha ob uporabi 200 -400 l vode 440 g/ha	Tretira se po vzniku koruze, ko ima koruza 2 do 6 razvitih listov	Dobro zatira v odmerku 330 g/ha z dodatkom močila: - ozkolistne pleveli: ljulke, proso, enoletno latovko, navadni oves,muhviče in divji sirek; - širokolistne pleveli: ščire, navadno lobodo, navadno ogrščico, navadni plešec, navadno rosnico, kamilice, slizek, navadni nefrolepsis, ščavjelistno dresen, breskovo dresen, njivsko redkev, njivsko gorjušico, navadno zvezdico, njivski mošnjak in jetičnik. Dobro zatira v odmerku 440 g/ha z dodatkom močila: - ozkolistne pleveli:

(dikamba 55 %+ nikosulfuron 9,2%+ rimsulfuron 2,3%) z dodatkom močila Prepovedan na VVOI in za vključene v KOPOP.		(BBCH 12-16) .	srakonje, kostrebo; - širokolistne plevel: belo metliko, mnogosemensko metliko ter njivsko vijolico. Zadovoljivo zatira v odmerku 440 g/ha z dodatkom močila: - ozkolistne plevel: plazečo pimico; - širokolistne plevel: baržunasti oslez, navadni plotni slak, njivski osat, plezajočo lakoto, drobnocvetni rogovilček, veliki trpotec, ptičjo dresen, navadni slakovec, navadno solinko, pasje zelišče, škrbinke) in bodič.
Aliseo (nikosulfuron 30% + rimsulfuron 15%) + močilo TREND 90 Prepovedan na VVOI in za vključene v KOPOP	70 g/ha	po vzniku koruze in plevela, ko ima koruza od 2 do 8 listov (BBCH 12-18), plevel pa od 2 do 4 liste (BBCH 12-14).	Sredstvo deluje dobro na: - ozkolistni plevel: kostrebo, muhvič, enoletno latovko in krvavo rdečo srakonjo; - širokolistni plevel: navadno zvezdico, pravo kamilico in enoletni golšec. Sredstvo deluje zadovoljivo na: belo metliko, pasje zelišče in bodič.
Motivell 1 l/ha (nikosulfuron 4%) Motivell extra 6 OD 0,75 l/ha (nikosulfuron 6%) Kelvin, Kelvin OD 1 l/ha (nikosulfuron 4%) Kelvin max 0,75 l/ha (nikosulfuron 6%) Nicos h 1 l/ha (nikosulfuron 4%) Samson extra 6 OD 0,75 l/ha (nikosulfuron 6%) Samson 4 SC 1 l/ha (nikosulfuron 4%) Milagro extra 6 OD 0,75 l/ha (nikosulfuron 6%) Milagro 240 SC 170 ml/ha (nikosulfuron 24%) Entail 170 ml/ha (nikosulfuron 4%) Bandera 1 l/ha (nikosulfuron 4%) Primer 1 l/ha (nikosulfuron 4%) Talisman 1 l/ha (nikosulfuron 4%) Strech 1 l/ha (nikosulfuron 4%) Victus OD 1,0 L/ha (nikosulfuron 4%)	Odvisno od pripravka od 0,75 l/ha do 1 l/ha ali 170 ml/ha	Po vzniku, ko ima koruza 3- 6 listov, plevel pa 2-6. Prepovedan na VVOI. Za vključene v KOPOP je dovoljeno 40 g aktivne snovi nikosulfuron na hektar na leto	Primer izračuna odmerka na 40 g aktivne snovi nikosulfuron /ha: Kelvin max vsebuje 6% a.s., v odmerku 0,75 L/ha je 45 g a.s. nikosulfuron /ha. Zato je potrebno zmanjšati odmerek na 0,66 L/ha, da se ne preseže dovoljena količina 40 g a.s. nikosulfuron/ha.
Milagro plus (dikamba 22%, nikosulfuron 5%) Prepovedan na VVOI in za vključene v KOPOP	0,8 L/ha	S sredstvom se tretira po vzniku koruze v razvojni fazi, ko ima koruza razvitih od dva do osem listov (BBCH 12-18), ko so pleveli v zelo zgodnjih razvojnih fazah.	za zatiranje enoletnega ter večletnega širokolistnega in ozkolistnega plevela: - za zatiranje naslednjih širokolistnih plevelov: srhkodlakavi ščir, navadna ambrozija, bela metlika, izrodna, navadni kristavec, samosevna navadna sončnica, ščavjelista dresen, njivska gorjušica , ter naslednjih ozkolistnih plevelov: golo proso in vznikel divji sirek iz semena - za zadovoljivo zatiranje naslednjih širokolistnih plevelov: baržunasti oslez, navadni oslez, breskovolistna, navadni toliščak, pasje zelišče, laški bodič, njivski osat , ter naslednjih ozkolistnih plevelov: krvavordeča srakonja, navadna kostreba, sivozeleni muhvič, zeleni muhvič, golo proso, rizomi divjega sirka.
Genki			

(mesotriion 8 % nikosulfuron 3 %) Prepovedan na VVOL Za vključene v KOPOP je dovoljeno 40 g aktivne snovi nikosulfuron na hektar na leto	1 – 1,2 L/ha	Uporablja po vzniku, v razvojni fazi ko ima koruza razvitih od 2 do 8 listov (BBCH 12- 18).	za zatiranje nekaterih vrst enoletnega in večletnega širokolistnega ter ozkolistnega plevela v odmerku od 1 do 1,2 L/ha.
Hector flex (dikamba 51% nikosulfuron 6,2% (rimsulfuron 3,1%) Prepovedan na VVOI in za vključene v KOPOP	0,48 kg/ha ali v deljenem (split) odmerku 2 x 0,24 kg/ha	Tretira se po vzniku koruze, od razvojne faze, ko ima koruza razvita dva lista, do faze, ko je razvitih 9 ali več listov (BBCH 12-19	Za zatiranje enoletnega in večletnega ozkolistnega ter širokolistnega plevela. redstvu HECTOR FLEX se obvezno doda močilo (neionsko močilo (npr. Trend 90) ali močilo na osnovi rastlinskih olj), ki se uporabi za izboljšanje oprijemljivosti sredstva HECTOR FLEX in se uporabi v skladu z navodili proizvajalca močila.
Tarot 25 WG Rim 25 WG Rincon 25 SG Rimuron 25 WG (rimsulfuron 25%) Prepovedan na VVOI in za vključene v KOPOP.	40 - 60 g/ha 60 g/ha 60 g/ha 50 g/ha	Po vzniku, ko ima koruza 2- 8 listov BBCH 12-18, plevel pa 2-3. Po vzniku, BBCH 10-18. Z obveznim dodatkom ustreznega močila.	- za zatiranje nekaterih vrst širokolistnega plevela kot so npr. navadna zvezdica, srhodlakavi ščir in baržunasti oslez, ter enoletnih ozkolistnih plevelov kot so npr. kostreba, srakonje in muhviči
Corey (nikosulfuron 30% rimsulfuron 15%) Prepovedan na VVOI in za vključene v KOPOP	100 g/ha	Tretira se po vzniku, ko ima koruza od 2 do 8 razvitih listov (BBCH 12-18).	za zatiranje nekaterih vrst enoletnega in večletnega širokolistnega in ozkolistnega plevela
Elumis (mezotriion 36%+ nikosulfuron 3%) Prepovedan na VVOI. Za vključene v KOPOP je dovoljeno 40 g aktivne snovi nikosulfuron na hektar na leto.	1,5 L/ha	po vzniku od razvojne faze koruze 1-2 listov (BBCH 11-12) do razvojne faze koruze največ osem listov (BBCH 18)	Sredstvo dobro deluje na ozkolistne plevela kot so: krvavordeča srakonja, navadna kostreba, gluhi oves, enoletna latovka, muhviči, divji sirek, proso, ter na širokolistne plevela kot so: njivski mošnjak, baržunasti oslez, navadno ambrozijo, navadni kristavec, navadni bodič, njivsko gorjušico, samoniklo sončnico, njivsko spominčico, navadno rosnico, drobnocvetni rogovilček, metlike, navadni grint, samosevce krompirja, navadni zebat, njivsko redkev, navadni plešec, dresni, perzijski jetičnik, navadno kislico, pasje zelišče, mrtvo koprivo, navadno zvezdico in grašice. njivsko vijolico, ščire, samoniklo oljno ogrščico, kamilice, plezajočo lakoto, lobode in navadni slakovec. Sredstvo zavira razvoj naslednjim plevelom: njivski preslici, navadnemu plotnemu slaku in njivskemu osatu.
Spandis (dikamba 40 %+ prosulfuron 4% + nikosulfuron 10%) Prepovedan na VVOI in za vključene v KOPOP	0,4 kg/ha ob dodatku močila za izboljšanje oprijemljivosti.	Sredstvo se uporablja po vzniku koruze od razvojne faze, ko sta dva lista razvita, do razvojne faze, ko je 8 list razvit (BBCH 12- 18).	Za zatiranje enoletnega in večletnega širokolistnega ter ozkolistnega. Sredstvo zelo dobro deluje (95-100 % učinkovitost) na naslednje plevela: - širokolistni pleveli: baržunasti oslez, ščiri, navadni plešec, metlike, navadni kristavec, drobnocvetni rogovilček, navadni oslez, kamilice , enoletni golšček, ščavjelistna dresen, breskova dresen, njivska gorjušica, njivska škrbinka, navadna zvezdica, njivski mošnjak in navadni bodič; - ozkolistni pleveli: proso. Sredstvo dobro deluje (85-94,9 % učinkovitost) tudi na naslednje plevela: - širokolistni pleveli: pelinolistna ambrozija, navadni plotni slak, njivski osat, plezajoča lakota, mrtve koprive in vijolice; - ozkolistni pleveli: navadna kostreba, plazeča pimica, enoletna latovka, zeleni muhvič, sivozeleni muhvič in divji sirek. Sredstvo deluje (70-84,9 % učinkovitost) tudi na naslednje širokolistne plevela: njivni lisičji rep, njivski slak, ptičja

			dresen, navadni tolščak in pasje zelišče. Sredstvo slabo deluje na srakonje, ne deluje pa na perzijski jetičnik.
Arigo (mezotrion 36% + nikosulfuron 12% + rimsulfuron 3%) Prepovedan na VVOI in za vključene v KOPOP	330 g/ha +močilo Trend 90	po vzniku koruze, v fenološki fazi od dveh do osmih listov koruze (BBCH 12 do 18) in ko ima plevel vsaj dva razvita lista oziroma so ozkolistni pleveli visoki največ 15 cm.	Sredstvo učinkovito zatira naslednje plevelne vrste (85-100% učinkovitost*): baržunasti oslez, srhodlakavi, njivska pasja kamilica, navadni pelin, navadna loboda, navadna ogrščica, navadni plešec, bela metlika, navadni osat, navadni kristavec, navadna rosnica, navadni zebrat, drobnocvetni rogovilček, plezajoča lakota, mehka krvomočnica, navadna sončnica, kamilica, njivska spominčica, vodna dresen, navadni grint, njivska gorjušica, črni razhudnik, njivska škrbinka, navadna zvezdica, njivski mošnja, velika kopriva, bršljanovolistni jetičnik, njivska vijolica, gluhi oves, navadna kostreba, plazeča pimica, navadno proso, enoletna latovka, zeleni muhvič in vretenčasti muhvič , Sredstvo zaviralno deluje na naslednje plevelne vrste (70 do 84% učinkovitost): njivski osat, vejičasti rogovilček, škratnordeča mrtva kopriva, ptičja dresen, ščavjelistna dresen, breskova dresen, njivski čišljak, močvirski čišljak, bršljanovolistni jetičnik in srakonjo.
Successor 600 (petoksamid 60%) Prepovedan na VVOI in za vključene v KOPOP	2 l/ha	Po setvi pred vznikom koruze ali po vzniku koruze do 4 listov..	Sredstvo zatira ozkolistne plevel, kot so npr.: navadna kostreba, muhviči in enoletna latovka ter širokolistne plevel kot so npr.: srhodlakavi ščir, bela metlika, drobnocvetni rogovilček, kamilice, breskova dresen in pasje zelišče
DOVOLJENI HERBICIDI NA VVOI IN ZA VKLJUČENE V KOPOP			
Merlin Flexx (izoksafutol 24 %)	0,3 -0,4 l/ha	Pred vznikom ali po vzniku najkasneje do 2-3 listov koruze BBCH 9-13.	Sredstvo dobro zatira: baržunasti oslez, belo metliko, pasje zelišče, divji sirek in ščavjelistno dresen. Sredstvo slabše zatira: ščire, ptičjo dresen, breskovo dresen, muhviče, navadno kostrebo in mrtve koprive.
Frontier X2 (dimetenamid-P 72%)	1-1,4 l/ha	Pred setvijo z inkorporacijo v tla, ali takoj po setvi pred vnikom, tla morajo biti vlažna.	Učinkovito zatira naslednje ozkolistne plevel: navadno kostrebo, krvavordečo srakonjo, lasasto proso, zeleni muhvič, malo srakonjo, sivozeleni muhvič, divji sirek iz semena. Dobro deluje tudi proti naslednjim širokolistnim plevelom: srhodlakavi ščir, navadna rosnica, plezajoča lakota, kamilice, njivska spominčica, breskova dresen in pasje zelišče.
Adengo (izoksafutol 22,5% + tienkarbazon-metil 9%)	0,44 L/ha	pred ali po vzniku koruze najpozneje do faze 3 listov koruze (BBCH 00 - 13) ob porabi 200-400 L vode/ha.	Sredstvo učinkovito zatira naslednje plevel: navadno loboda, navadni plešec, metliko, drobnocvetni rogovilček, kamilico, spominčico, breskovo dresen, ščavjelistno dresen, pasje zelišče, navadno zvezdico, zeleni muhvič, gluhi oves, enoletna latovka, krvavo rdečo srakonjo, njivsko vijolico, navadni slakovec in navadno kostrebo.
Monsoon active (foramsulfuron 3%+ tienkarbazon-metil 1%)	0,75 –2 l/ha	S sredstvom se tretira v razvojni fazi koruze od 2 do 6 listov (BBCH 12-16), v primeru deljenega tretiranja pa v razvojni fazi koruze od 2 do 8 listov (BBCH 12-18). Ozkolistni plevel naj bo v razvojni fazi BBCH 12-21, širokolistni plevel pa v razvojni fazi BBCH 12-15.	Sredstvo učinkovito zatira (>86% učinkovitost): - ozkolistni plevel: krvavordeča srakonja, navadna kostreba, enoletna latovka, muhviči in divji sirek; - širokolistni plevel: baržunasti oslez, ščiri, pelinolistna ambrozija, navadna loboda, metlike, navadni kristavec, navadna sončnica, enoletni golšec, pasje zelišče, navadna zvezdica, prava kamilica, dresni, navadni grint, laški bodič in hrapava škrbinka. Sredstvo zadovoljivo zatira (70-85 % učinkovitost): njivski osat. Sredstvo delno

			zatira malo srakonjo, njivski slak, navadno rosnico in perzijski jetičnik.
Stomp aqua (pendimetalin 45,5%)	2,9 l/ha	Pred vznikom ali po vzniku do BBCH14 (štirje listi razgrjeni).	Enoletni ozkolistni in nekaterih vrst širokolistni plevel. Učinkovito zatira naslednje plevel: enoletno latovko, navadno zvezdico, navadno lobodo, poljski mak, belo metliko, njivsko spominčico, njivsko vijolico, ptičjo dresen, škrlatnordečo mrtvo koprivo, njivno kurjo češnjico, jetičnik, pasje zelišče ter samoniklo oljno ogrščico. Slabše zatira naslednje plevel: navadno latovko, navadno rosnico, navadni plešec ter kamilico – razen kamilice v jarem ječmenu.
Sharpen 33 EC (pendimetalin 33%)	3-5 L/ha	se tretira po setvi, vendar pred vznikom posevka (BBCH 00-09)	- zatira (>80% učinkovitost) naslednje ozkolistne plevel: lisičji rep, srakoperec, krvavordeča, navadna kostreba, laška ljulka, enoletna latovka in sivozeleni muhvič. Zmanjševanje zapleveljenosti (80% učinkovitost) naslednje širokolistne plevel: ščir, samosevna ogrščica, navadni plešec, bela metlika, osat, navadni kristavec, čapljevec, lakota, navadna posončnica, škrlatnordeča mrtva kopriva, kamilica, enoletni golšec, njivska spominčica, poljski mak, dresen, tolščak, navadna zvezdica, redkev, pasje zelišče, njivski mošnjak, jetičnik in njivska vijolica - slabo zatira (40-60% učinkovitost) naslednje plevel: slak in njivska preslica.
Sharpen plus (pendimetalin 40%)	2,5-4 L/ha	se tretira po setvi, vendar pred vznikom posevka (BBCH 00-09)	- zatira (>80% učinkovitost) naslednje ozkolistne plevel: lisičji rep, srakoperec, krvavordeča, navadna kostreba, laška ljulka, enoletna latovka in sivozeleni muhvič.- zmanjševanje zapleveljenosti (80% učinkovitost) naslednje širokolistne plevel: ščir, samosevna ogrščica, navadni plešec, bela metlika, osat, navadni kristavec, čapljevec, lakota, navadna posončnica, škrlatnordeča mrtva kopriva, kamilica, enoletni golšec, njivska spominčica, poljski mak, dresen, tolščak, navadna zvezdica, redkev, pasje zelišče, njivski mošnjak, jetičnik in njivska vijolica - slabo zatira (40-60% učinkovitost) naslednje plevel: slak in njivska preslica.
Starane forte (fluroksipir 33,3%)	0,54 L/ha	Tretira se v razvojni fazi, ko ima koruza razvitih dva do šest listov (BBCH 12-16).	Širokolistni plevel: plezajočo lakoto, navadno zvezdico, breskovo dresen, drobnocvetni rogovilček in njivski slak; - sredstvo zmanjšuje zapleveljenost z navadnim plotnim slakom. Za zatiranje enoletnega širokolistnega plevela in nekaterih vrst večletnega širokolistnega plevela: njivski slak se lahko tretira tudi točkovno, ko je koruza visoka 30 do 100 cm ob obvezni uporabi ščitnika.
Bonaca (fluroksipir 25%)	0,8 L/ha	Tretira se od fenološke faze dveh razvitih listov do faze šestih razvitih listov (BBCH 12-16)	Za zatiranje enoletnega širokolistnega plevela in nekaterih vrst večletnega širokolistnega plevela
Eltivis (fluroksipir 25%)	0,8 L/ha	Tretira se od fenološke faze dveh razvitih listov do faze šestih razvitih listov (BBCH 12-16)	Za zatiranje enoletnega širokolistnega plevela in nekaterih vrst večletnega širokolistnega plevela
Peak 75 WG (prosulfuron 75%)+ močilo	20 g/ha	Po vzniku, ko ima koruza največ 7 listov, plevel pa 6.	Za zatiranje večine vrst enoletnega širokolistnega plevela v koruži. Odlično deluje tudi na kislice in dobro na njivski osat.

Laudis (tembotrion 4,4%) Laudis WG30 (tembotrion 20%)	1,15 – 2,5 l/ha 0,25 - 0,5 kg/ha	Po vzniku, ko ima koruza 2-8 listov BBCH 12-18, širokolistni plevel pa 2-8, ozkolistni 2 lista.	Zelo dobro zatira (učinkovitost >92 %): belo metliko, mnogosemnsko metliko, breskovo dresen, ščavjelistno dresen, drobnocvetni rogovilček, pasje zelišče, navadno zvezdico, pravo kamilico, njivski mošnjak, baržunasti oslez, navadni kristavec, tridelni mrkač, navadno kostrebo, zeleni muhvič in enoletno latovko. Dobro zatira (učinkovitost 88-92 %): ptičjo dresen, navadni slakovec, srhkodlakavi ščir, njivski slak, divji sirek, plezajočo lakoto in golo proso.
Capreno (tembotrion 4,4% + tienkarbazon-metil 9%)	0,3 L/ha + močilo na osnovi demetiliranega repičnega olja MERO	Po vzniku koruze, ko ima le ta razvitih od 2 – 6 pravih listov (BBCH 12-16). Ozkolistni pleveli so najbolj občutljivi v razvojnih fazah od enega do treh razvitih pravih listov, širokolistni pa v razvojnih fazah od dveh do štirih razvitih pravih listov.	Sredstvo učinkovito zatira: belo metliko, breskovo dresen, ščavjelistno dresen, drobnocvetni rogovilček, pasje zelišče, navadno zvezdico, pravo kamilico, njivski mošnjak, baržunasti oslez, navadni kristavec, navadno kostrebo, zeleni muhvič, navadni slakovec, srhkodlakavi ščir in prosa. Sredstvo zmanjšuje zapleveljenost z enoletno latovko.
Mustang 306 SE (2,4 D,2–EHE 45,242% +florasulam 6,25%)	0,5 - 0,6 l/ha	Po vzniku koruze, ko ima koruza 4 – 5 listov, BBCH 14 – 15.	Enoletni in nekateri večletni širokolistni pleveli za zatiranje enoletnega širokolistnega plevela kot so metlike, dresni, navadna zvezdica, navadna kurja črevca, prava kamilica plezajoča lakota, pelinolistna ambrozija, za zmanjšanje zapleveljenosti s perzijskim jetičnikom ter za večletne širokolistne plevela kot so njivski osat, njivski slak.
Esteron (2,4D-2 EHE 90,5 %)	1 l/ha	Po vzniku koruze, ko ima koruza 4 – 6 listov, BBCH 14 – 16.	Enoletni širokolistni pleveli: srhkodlakavi ščir, navadni plešec, bela metlika, njivski osat, navadni osat, njivski slak, navadna rosnica, poljski mak, veliki trpotec, ptičja dresen, navadni slakovec, ščavjelistna dresen, breskova dresen, njivska redkev, njivska gorjušica, pasje zelišče in perzijski jetičnik.
Herbocid XL (2,4D 60 %)	1,25 L/ha	Tretira se v razvojni fazi, ko ima koruza razvite 3 - 4 liste oziroma je visoka 15 - 20 cm (BBCH 13-14).	Uporablja se za zatiranje enoletnega in večletnega širokolistnega plevela.
Harmony 50 SX (tifensulfuron 50%)+ močilo	22,5 g/ha + močila npr. Trend 90	Tretira se, ko je koruza v razvojni fazi 2-8 listov (BBCH 12-18) in ko je plevel v fazi 2-4 pravih listov (BBCH 12-14)	Občutljivi pleveli: srhkodlakavi ščir, navadna loboda, navadni plešec, navadni zebrat, prava kamilica, nedišeča trirobka, ptičja dresen, ščavjelistna dresen, njivska redkev, kislica, njivska gorjušica, navadna zvezdica, njivski mošnjak in oljna ogrščica. Manj občutljivi pleveli: navadni slakovec, njivska vijolica, perzijski jetičnik in njivski slak.
Focus ultra (Cikloksidim 10%) za koruso, ki je tolerantna na aktivno snov cikloksidim	2 L/ha – 4L /ha z dodatkom močila DASH HC	Sredstvo se uporablja po vzniku. Tretiranje se opravi od razvojne faze, ko so enoletni ozkolistni plevel in samosevna žita v razvojni fazi od dveh pravih listov, do konca razraščanja (BBCH 12-29) in večletni ozkolistni pleveli v razvojni fazi od prvih treh do petih pravih listov (BBCH 13-15)	Sredstvo zatira: plazečo pirnico, prstasti pesjak, divji sirek, samosevno navadno pšenico, samosevno trdo pšenico, samosevno rž, samosevni navadni ječmen, samosevni mišji ječmen, samosevno koruso, ki ni odporna na aktivno snov cikloksidim, samosevni navadni oves, navadni srakoperec, gluhi oves, stoklase, krvavordečo srakonja, ljuljk, proso, navadno latovko, muhvič, njivski lisičji rep ter navadno kostrebo.
Equip (foramsulfuron 2,25%)	2-2,5 L/ha	Po vzniku, ko ima koruza 2-6 listov BBCH 12-16.	Ozkolistni plevel: njivski lisičji rep, krvavordeča srakonja, navadna kostreba, ljulke, enoletna latovka, muhviči in nekatere druge; - širokolistni plevel: baržunasti oslez, ščiri, pelinolistna ambrozija, metlike, drobnocvetni rogovilček, koprive, enoletni

			golšec, pasje zelišče, navadna zvezdica in nekateri drugi; - večletni plevel: divji sirek, njivski osat, njivski slak, plazeča pimica.
Callisto 480 SC (mezotrion 48%) + močilo Temsa SC (mezotrion 10%) Osorno (mezotrion 10%) Osorno 480 SC (mezotrion 48%)	0,15 - 0,25 L/ha 1,5 L/ha 1,5 L/ha 0,2 – 0,27 L/ha	Pred in po vzniku do razvojne faze največ 8 listov koruze	Za zatiranje širokolistnega plevla in navadne kostrebe. Deluje na: njivski mošnjak, baržunasti oslez, navadno ambrozijo, navadni kristavec, navadni bodič, njivsko gorjušico, samoniklo sončnico, njivsko sponinčico, navadno rosnico, drobnocvetni rogovilček, metlike, navadni grint, samosevce krompirja, navadni zebat, njivsko redkev, navadni plešec, dresni, perzijski jetičnik, navadno kislico, pasje zelišče, mrtvo koprivo, navadno zvezdico in grašice. V stadiju dveh do štirih listov dobro zatira: njivsko vijolico, ščire, samoniklo oljno ogrščico, krvavordečo srakonjo, navadno kostrebo, kamilice, plezajočo lakoto, lobode in navadni slakovci. Razvoj zavira naslednjemu plevelu: njivski preslici, navadnemu plotnemu slaku in njivskemu osatu. Nezadovoljivo pa deluje na njivni lisičji rep, muhvič, gluhi oves, stoklaso, navadni srakoperec, enoletno latovko in navadni oslez
Botiga (mezotrion 9% + piridat 30%)	1 l/ha	s sredstvom se tretira po vzniku koruze, v razvojni fazi, ko ima koruza razvitih od dva do osem listov (BBCH 12-18); ali • v deljenem (split) odmerku 2 × 0,5 L/ha, pri porabi vode 200-400 L/ha; s sredstvom se tretira po vzniku koruze, v razvojni fazi ko ima koruza razvitih od dva do osem listov (BBCH 12-18) - v tem obdobju se izvede dve tretiranji v razmaku najmanj 7 dni.	zatira naslednje plevelne vrste: njivsko kurjo češnjico, samosevno oljno ogrščico, belo metliko, smokvasto metliko, plezajočo lakoto, njivsko mrtvo koprivo, škrlatnordečo mrtvo koprivo, dresni, plevele iz rodu razhudnikov, navadno zvezdico, njivski mošnjak, jetičnike in njivsko vijolico. Omejuje številčnost populacije: navadne kostrebe in navadnega osleza.
Onyx (piridat 60%)	1,5 l/ha ali 2 x 0,75 l/ha	s sredstvom se tretira po vzniku koruze, v razvojni fazi, ko ima koruza razvitih od dva do osem listov (BBCH 12-18)	za zatiranje oz. omejevanje številčnosti nekaterih vrst enoletnega širokolistnega plevla. Sredstvo ONYX v odmerku 1,5 L/ha zatira naslednje plevelne vrste: enoletni golšec (<i>Mercurialis annua</i>), pasje zelišče (<i>Solanum nigrum</i>), navadni ščir (<i>Amaranthus retroflexus</i>), bele metlike (<i>Chenopodium spp.</i>), škrlatnordeča mrtva kopriva (<i>Lamium purpureum</i>), dresni (<i>Polygonum spp.</i>) in navadni oslez (<i>Hibiscus trionum</i>). Sredstvo ONYX v deljenem (split) odmerku 2 x 0,75 L/ha zatira metlike (<i>Chenopodium spp.</i>) in navadni oslez (<i>Hibiscus trionum</i>) ter omejuje številčnost populacije dresni (<i>Polygonum spp.</i>)
Clap (piridat 30%)	0,3 L/ha	tretiranje se opravi od razvojne faze, ko ima rastlina razvita dva lista, do faze devet ali več listov razvitih (BBCH 12-19).	za zatiranje osatov (<i>Cirsium spp.</i>), kamilic iz rodu <i>Matricaria</i> (<i>Matricaria spp.</i>) in njivske pasje kamilice (<i>Anthemis arvensis</i>) ter za omejevanje številčnosti populacije bodičev (<i>Xanthium spp.</i>)

Opomba za uporabo FFS na osnovi aktivne snovi nikosulfuron:

FFS z aktivno snovjo nikosulfuron lahko uporabljajo pri izvajanju operacij Vodni viri, Ohranjanje kolobarja – stopnja III in Varovalni pasovi ob

vodotokih intervencije IRP 18.02 Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila – Naravni viri (KOPOP – Naravni viri) iz Strateškega načrta SKP 2023–2027. Pri tem je treba upoštevati strokovno mnenje Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, iz katerega izhaja, da nikosulfuron ne predstavlja tveganja za spiranje v podzemno vodo, če letna količina te aktivne snovi ne presega vrednosti **40 g aktivne snovi na hektar tretirane površine**.

Prepovedan na VVOI - pomeni, da navedene herbicide ni dovoljeno uporabljati na kmetijskih zemljiščih, ki ležijo na najožjih vodovarstvenih območjih.

Pred setvijo je možno uporabiti tudi totalni herbicide, ki so registrirani v koruzi pred setvijo, dovoljeni so na VVOI in za vključene v KOPOP :

	PRED SETVIJO KORUZE	
Glifosat v obliki izopropilamino soli + glifosat v obliki kalijeve soli	Clinic extreme	1,2 – 4,0 l/ha
Glifosat v obliki kalijeve soli	Roundup dynamic Roundup energy Roundup max Roundup star	1,08 – 2,16 L/ha 1,6 L/ha 2,0 L/ha 1,5 – 5,0 L/ha

PRED UPORABO POSAMEZNIH FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV JE POTREBNO PREBRATI IN UPOŠTEVATI NAVODILA ZA UPORABO, PREDPISANE RAZDALJE OD VODA 1. IN 2. REDA, VODITI EVIDENCE O UPORABI FFS, HRANITI RAČUNE.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN

Datum objave obvestila: 12.04.2024 07:24
Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Objavil/a: MIKLAVC Jože
Pripravil: **Jože Miklavc**
[Seznam registriranih FFS](#)

