



Osrednja Slovenija - Kmetijski inštitut Slovenije / Pečkarji / 33. Varstvo pečkarjev

33. Varstvo pečkarjev - 15.04.2024 10:33 - Zaključeno



Nasadi jablan so v različnih fazah cvetenja glede na sorto in lokacijo. Zgodnje sorte jablan že zaključujejo s cvetenjem, med tem ko pozne sorte na hladnih legah začenjajo cveteti.

V prihodnjih dneh se nam obeta nestanovitno, aprilsko vreme, ki predstavlja tveganje za primarne okužbe z jablanovim škrlupom. Po zaključenem cvetenju drevesa preidejo v fazo intenzivnega priraščanja zelenih tkiv. Novo prirasla tkiva so nezaščitena s fungicidno oblogo in dovzetna za glivične okužbe, zato je potrebno oblogo konstantno obnavljati na 5 dni oz. pred napovedanimi padavinami. Obloga velja za sprano, če je skupno padlo več kot 25 mm padavin in je zato potrebno ponovno opraviti škropljenje. Svetujemo preventivni pristop z uporabo dotikalnih fungicidov kot so **Delan Pro**, **Delan 700 WG** in **Alcoban**. Glede na napovedano obdobje hladnega vremena in morebitnih deževnih obdobjih daljših od 3 dni, je še vedno primerna uporaba sistemskih fungicidov iz skupine anilinopiramidinov kot so **Chorus 50 WG**, **Chorus Forte**, **Avalon**, **Batalion 450 SC**, **Erune 40 SC**, **Laitane**, **Faban**, **Mythos**, **Pretil**, **Pyramid**, **Pyrus 400 SC** in **Scala**. Vsem sistemskim fungicidom, razen sredstvu **Faban** in **Chorus Forte**, je potrebno dodati enega izmed prej naštetih dotikalnih pripravkov na osnovi a.s. ditianon. Uporaba sistemskih IBE fungicidov, kot so **Duaxo koncentrat**, **Difol**, **Score 250 EC**, **Difcor 250 EC**, **Mavita** ali **Revyona** bi bila smiselna v nasadih, kjer preventivno škropljenje pred obilnejšim dežjem (20 mm) ni bilo opravljeno in je bilo listje mokro več kot 2 dni. V tem primeru je potrebno tretiranje opraviti čimprej, ko je listje suho. Naštetim pripravkom je potrebno dodati še enega od zgoraj naštetih kontaktnih pripravkov.

V **ekološki pridelavi** lahko za varstvo pred jablanovim škrlupom in pepelovko uporabite pripravek **Curatio žvepleno apnena brozga**. Stransko delovanje na jablanov škrlup ima tudi sredstvo **Karbicure**.

Ob napovedani ohladitvi in glede na stanje na terenu, za varstvo pred jablanovo pepelovko svetujemo uporabo sistemskih pripravkov kot so **Sercadis Plus**, **Sercadis**, **Luna Experience** in **Revyona**. Uporaba žeplovih pripravkov bo ponovno aktualna ob prvi otoplitvi (temperature nad 15°C).

V kolikor se je do zaključka cvetenja na eno **belo lepljivo ploščo** ujelo preko 30 osic jabolčne in hruševe grizlice, je prag škodljivosti presežen. Ukrepati je potrebno, ko so drevesa popolnoma odcvetela, s pripravkom **Mospilan 20 SG** ali s pripravkom **Neemazal –T/S**, ki je dovoljen tudi v ekološki pridelavi. Obe sredstvi imata delovanje tudi na druge sesajoče in grizoče organizme.

Sedaj je zadnji čas, da izobesite feromonske dispenzorje **za metodo zbeganja ali konfuzije** proti jabolčnemu zavijaču ter feromonske pasti za spremljanje populacije jabolčnega zavijača v nasadih s klasičnim varstvom pred škodljivcem.

Na terenu opazamo prisotnost malega zimskega pedica, v cvetnih šopih, ki že povzroča škodo. Pridelovalci preglejte nasade in ukrepajte z enim izmed insekticidnih pripravkov, ki dosežejo ustrezno učinkovitost predvsem na zgodnjih stadijih gosenic. Priporočamo uporabo biotičnih pripravkov kot sta **Agree WG** in **Delfin WG**.

Pred uporabo FFS preberite navodila in veljavne registracije ter jih upoštevajte! Pred uporabo čebelam nevarnih pripravkov pokosite cvetočo podrast in opravite škropljenje v večernem ali nočnem času!

Pripravila: Vesna Kocjan in David Snoj
Kmetijski inštitut Slovenije

Datum objave obvestila: 15.04.2024 10:33
Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: Kocjan Vesna
Pripravila: **Vesna Kocjan**
[Seznam registriranih FFS](#)

