

31. OBVESTILO O VARSTVU SADOVNJAKOV št.8 - 17.04.2024 14:13 - Zaključeno



Sorte jabol, ki so v razvoju hitreje ('Idared', 'Jonagold', ...), so na najbolj ugodnih legah dosegle fenološko fazo: konec cvetenja (69 po BBCH skali) do plodiči večji od 10 mm (71 po BBCH skali).

JABLANOV ŠKRLUP

Ob zadnjih padavinah, ko je v Mariboru padlo 18 mm padavin, smo zabeležili močnejši izbruh askospor **jablanovega škrlupa**. Pri tem pogoji za primarno okužbo z jablanovim škrlupom zaradi nizkih temperatur niso bili izpolnjeni. Ob naslednjih padavinah lahko ponovno pričakujemo izbruhe askospor in ob višjih temperaturah tudi nove primarne okužbe, zato priporočamo, da škropljenje opravite še **pred napovedanimi padavinami**.

Za škropljenje proti **jablanovemu škrlupu** priporočamo uporabo enega od kontaktnih ali površinskih fungicidov: aktivna snov (a.s.) metiram (**Polyram DF**, uporaba zalog do 28.11.2024), ali pripravkov na osnovi ditianona (**Delan 700WG**, **Delan PRO**, **Alcoban**) ali pripravke na osnovi kaptana (**Captan 80 WG**, **Merpan 80 WDG**, **Merplus**, **Orthocide 80 WG**, **Scab 80 WG**, **Scab 480 SC**). Uporaba aktivne snovi ditianon v jabolkah in hruškah ne sme presegati skupne količine 2625 g aktivne snovi na ha v eni rastni dobi.

V nasadih, kjer je bila dosežena fenološka faza: plodiči večji od 10 mm (71 po BBCH skali) pa tudi pripravek na osnovi dodina (**Syllit 400 SC**). (Sredstva Syllit se ne sme mešati z možljivimi žvepli, bordojsko brozgo, s sredstvi, ki vsebujejo aktivne snovi kaptan, fenoksikarb, cink ali baker, apno, s sredstvi alkalne pH reakcije ter foliarnimi gnojili na osnovi morskih alg, cinka ali bakra. O možnostih mešanja z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi se je treba posvetovati z inetnikom registracije oziroma zastopnikom).

V kolikor škropljenje pred napovedanimi padavinami ne bo mogoče, ga je potrebno opraviti takoj po končanih padavinah oz. najkasneje v času 24 ur. V tem primeru je mogoče uporabiti enega od naslednjih pripravkov:

ANILINOPIRIMIDINI	IBE oz. SDHI FUNGICIDI
◦ Batalion 450 SC (0,7-1,0 L/ha) ◦ Faban (1,2 L/ha) ◦ Pyramid (1,125 L/ha) ◦ Pyrus 400 SC (1 L/ha) ◦ Chorus 50 WG (0,45 kg/ha) ◦ Scala (1,125 L/ha) ◦ Avalon (1,125 L/ha) ◦ Laitane (1,125 L/ha) ◦ Erune 40 SC (1,125 L/ha) ◦ Pretil (1,125 L/ha)	◦ Difcor 250 EC (0,2 L/ha) ◦ Difol (3,5 L/ha) ◦ Duaxo koncentrat (1,1 L na višinski meter krošnje/ha, najvišji dovoljeni odmerek pri enem tretiranju ne sme presegati 3,3L/ha) ◦ Mavita 250 EC (0,2 L/ha) ◦ Revyona (največ 2 L/ha) ◦ Score 250 EC (0,2 L/ha) ◦ Sercadis (0,25 – 0,3 L/ha) ◦ Sercadis plus (1,2 L/ha) ◦ Domark 100 EC (0,4 L/ha)

Sredstev Pyrus, Avalon, Laitane, Erune in Pretil ni dovoljeno mešati z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi. Ostalim naštetim pripravkom je potrebno dodati še enega od zgoraj naštetih kontaktnih pripravkov, razen pripravkoma Faban in Difol.

V **ekološki pridelavi** je mogoče uporabiti tudi pripravek **Curatio – žvepleno apnena brozga**, ki ima tudi letos dovoljenje za nujne primere, smejo pa ga uporabljati samo poklicni pridelovalci, ki so registrirani za ekološko pridelavo.

• JABLANOVA PEPELOVKA

Proti jablanovi pepelovki priporočamo pri **temperaturi nad 15°C** dodajanje enega izmed pripravkov na osnovi možljivega žvepla v priporočenih odmerkih:

- Cosan
- Pepelin

- Kumulus DF
- Microthiol disperss
- Microthiol special
- Sulfar
- Thiovit jet
- Vindex 80 WG

V nasadih, kjer je **jablanova pepelovka** močno prisotna, priporočamo dodajanje pripravkov, kot so:

- Luna experience
- Sercadis
- Sercadis plus
- Stroby WG
- Zato 50 WG

Sercadis in Sercadis plus inata delovanje tudi na jablanov škrlup

• JABOLČNI ZAVIJAČ

Ulove metuljčkov **jabolčnega zavijača** na feromonskih vabah beležimo na več spremljanih lokacijah. O optimalnih terminih zatiranja jabolčnega zavijača vas bomo pravočasno obvestili.

Opozarjamo tudi na redno spremljanje populacije **rdeče sadne pršice**, **mokaste uši**, **listnih uši** in **krvave uši** ter ob preseženem pragu škodljivosti njihovo zatiranje z enim od dovoljenih pripravkov.

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN

Datum objave obvestila: 17.04.2024 14:13

Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Objavil/a: MEŠL Miro

Pripravil: **Miro Mešl**

[Seznam registriranih FFS](#)

