

38. OBVESTILO ZA ZATIRANJE BOLEZNI V JEČMENU - 17.04.2024 14:52 - Zaključeno



Fenološki razvoj posevkov ječmena

Toplo vreme v predhodnih dneh je povzročilo skokovit razvoj ozimnega ječmena. Nekateri posevki so še vedno v fazi kolenčenja (BBCH 32), medtem ko so drugi že v sredini klasenja (BBCH 55).

Zatiranje ječmenove ramularijske pegavosti

V ječmenu se v zadnjih letih intenzivno pojavljajo okužbe z **ječmenovo ramularijsko pegavostjo** (*Ramularia collo-cygni*). Najprimernejši čas za njeno zatiranje je v razvojni fazi začetka klasenja. Možnosti za okužbe so še večje, če je v tem obdobju prisotno deževno vreme s pogostimi padavinami. Ker so posevki v različnih razvojnih stadijih, vam priporočamo, da jih pregledate in ob izpolnjenih zgoraj omenjenih pogojih (razvoj posevka in padavine), uporabite enega izmed naslednjih pripravkov (vsi navedeni zatirajo vse tri glivične bolezni na ječmenu): **REVYCARE** (1,5 L/ha), **ELATUS ERA** (1 L/ha), **SILTRAXPRO** (tretira se v razvojni fazi, ko je prvo kolence vsaj 1 cm od mesta razraščanja (BBCH 31), do vidnih prvih res (BBCH 49)) (1 L/ha); **ASCRA XPRO** (1,2 L/ha), **CAYUNIS** (1 L/ha), **DELARO FORTE** (1 L/ha), **ELATUS PLUS** (0,75 L/ha), **FOLPAN** (1,5 l/ha), **IMTREX XE** (2 L/ha), **LIBRAX** (1,33 – 2,0 L/ha), **PRIAXOR EC** (1,5 L/ha), **REVYSTAR XL** (1,0 – 1,5 L/ha) ali **ZANTARA** (1,5 L/ha). Pripravka **REVYSTAR** (1,5 L/ha) in **REVYTREX** (1,125 L/ha) le zmanjšujeta okužbe.

Na pšenici bodite pozorni na presežen prag za **listno pegavost**. Še vedno lahko opravite škropljenje z enim od pripravkov navedenih v prejšnjem obvestilu za varstvo žit:

<http://agromet.mkgp.gov.si/pp/Notices/Details?NoticeID=14175>

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 17.04.2024 14:52

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: RODIČ Karmen

Uredila: **Karmen Rodič**

Seznam registriranih FFS

