

40. VARSTVO ČEŠENJ IN VIŠENJ - 19.04.2024 08:50 - Zaključeno



V nasadih češenj in višenj se pospešeno oblikujejo plodiči (71 – 72 po lestvici BBCH).

Pridelovalce opozarjamo na možne prerazmnožitve listnih uši. Pozorni bodite na kolonije **črne češnjeve uši**, ki ima prag škodljivost 3 % napadenih poganjkov. Ukrepite lahko s pripravki: **AFINTO** (0,14 kg/ha), **TEPPEKI** (0,14 kg/ha), **MOVENTO SC 100** (1,5 l/ha; datum veljavnosti: 30.04.2024) ali **NEEMAZAL – T/S** (1,5 l/ha na meter višine krošnje in je primeren tudi za ekološko pridelavo),... Slednji ima učinek tudi na **gosenice pedicev**, ki lahko s hranjenjem na plodičih povzročijo izpad pridelka. Zoper njih pride v poštev tudi **AGREE WG** (1 kg/ha).

Za kvalitetnejši nanos poskrbite, da se aplikacija izvaja v mirnem vremenu. Priporočamo, da jo opravite v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 19.04.2024 08:50

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

[Seznam registriranih FFS](#)

