

37. Varstvo ozimnega ječmena - 19.04.2024 10:50 - Zaključeno



Na območju osrednje Slovenije in Gorenjske imajo ozimni ječmeni sedaj večinoma razvite vse liste. Na starejših listih so v posevkih opazna znamenja **ječmenove mrežaste pegavosti**, najmlajša dva do trije listi so večinoma še zdravi, na posameznih posevkih so se pege razširile že tudi nekoliko višje. Z izjemo na skeletnih tleh je v minulem obdobju zelo toplega in suhega vremena razvoj rastlin potekal hitro, razmere za širjenje okužb na mlajše liste pa niso bile posebej nevarne. Zato zatiranje bolezni večinoma do sedaj še ni bilo potrebno. Po zadnjih padavinah in ohladitvi vremena so razmere za širjenje bolezni spet bolj nevarne, poleg tega je obdobje od razvitega zgornjega lista in med klasenjem ječmena (BBCH 39-59) tudi primeren čas za preventivno zavarovanje posevkov pred **ječmenovo ramularijsko pegavostjo**. Bolezen se sicer začne pojavljati šele po zaključenem klasenju, najbolj v obdobju vremena z močnim sončnim obsevanjem, vendar je takrat za njeno zatiranje že prepozno. Pridelovalcem ječmena zato priporočamo, da posevke zavarujete s katerim od učinkovitih kombiniranih fungicidov, kot so **Ascra xpro**, **Cayunis**, **Delaro forte**, **Elatus era**, **Priaxor EC**, **Revcare**, **Siltra Xpro** in podobni.

V posevkih opazamo tudi hrošče žitnega strgača in poškodbe v obliki vzdolžnih črt na listih ter odložena jajčeca, ličink pa še ne, zato dodajanje insekticida sedaj še ni potrebno!

Pred uporabo natančno preberite in upoštevajte sredstvom priložena navodila!

Datum objave obvestila: 19.04.2024 10:50

Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: Urbančič Zemljič Meta

Pripravili: **Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt**

Seznam registriranih FFS

