

42. VARSTVO JAGOD - 22.04.2024 13:21 - Zaključeno



Jagode v zaprtih prostorih zorijo, na prostem tvorijo prve plodove.

Zaradi napovedanih padavin bodo ob povečani vlagi ugodne razmere za razvoj glivičnih bolezni. V nasadih jagod je potrebno izvajati varstvo proti **pepelastim** in **sivi plesni**, pri uporabi sredstev pa upoštevajte predpisane korenčne dobe.

- **AMYLO-X**, siva plesen in pepelovka, odmerek 1,5 do 2,5 kg/ha, tretiranje največ šestkrat v eni rastni dobi
- **BIOTIP SULFO 800 SC**, pepelovka, 3-5 l/ha, tik pred cvetenjem in v začetku razvoja plodu
- **BOTECTOR**, proti sivi plesni, odmerek 1 kg/ha, do šest tretiranj v eni rastni dobi
- **FYTOSAVE**, proti pepelovkam, 2 l/ha, do sedemkrat v eni rastni dobi
- **KARBICURE**, proti pepelovki, odmerek 3 kg/ha, največ osemkrat v eni rastni dobi
- **LIBRETO** (na prostem), proti sivi plesni, 1,5 l/ha, največ trikrat v eni rastni dobi
- **MAVITA 250 EC**, proti pepelovki, odmerek 0,5 l/ha, do dvakrat v rastni dobi
- **MIRADOR 250 SC**, proti pepelovki, odmerek 1 l/ha, do trikrat v eni rastni dobi
- **ORTIVA**, proti pepelovki, odmerek 1 l/ha, do trikrat v eni rastni dobi
- **PRESTOP**, proti sivi plesni, odmerek 6 kg/ha, trikrat zaporedoma samo v času cvetenja
- **PROLECTUS**, proti sivi plesni, odmerek 1,2 kg/ha, do trikrat v eni rastni dobi
- **PYRUS 400 SC**, proti sivi plesni, odmerek 2 l/ha, od cvetenja naprej, največ enkrat
- **SCALA**, proti sivi plesni, odmerek 2 l/ha, največ dvakrat v eni rastni dobi
- **SCORE 250 EC** (na prostem), proti pepelovki, 0,5 l/ha, največ dvakrat v eni rastni dobi
- **SERCADIS PLUS**, proti pepelovki, odmerek 0,6 l/ha, največ trikrat v eni rastni dobi
- **SERENADE ASO**, proti sivi plesni, odmerek 8 l/ha, do šest tretiranj v eni rastni dobi
- **SIGNUM**, proti pepelovki sivi plesni in črni pegavosti, odmerek 1,8 l/ha, do dve tretiranji v eni rastni dobi
- **STROBY WG**, proti pepelovki, odmerek 0,3 kg/ha, do dvakrat v eni rastni dobi
- **SWTCH 62,5 WG**, proti sivi plesni, odmerek 1 kg/ha, do trikrat v eni rastni dobi
- **TAEGRO** (v zaščiteneh prostorih), odmerek 0,185-0,37 kg/ha, do dvanajstkrat v eni rastni dobi
- **TELDOR SC 500** (na prostem), proti sivi plesni, odmerek 1,5 l/ha, do trikrat v eni rastni dobi
- **THIOVIT JET**, proti pepelovki, odmerek 2 – 4 kg/ha, do trikrat v eni rastni dobi
- **TOPAS 100 EC**, proti pepelovki, do dva krat v eni rastni dobi
- **VERTIPIN**, proti pepelovki, odmerek 6 l/ha, do šestkrat v eni rastni dobi
- **VITISAN**, proti pepelovki, odmerek 3 kg/ha, do osemkrat v eni rastni dobi
- **ZAFTRA AZT 250 SC**, proti pepelovki, odmerek 1 l/ha, do trikrat v eni rastni dobi
- **ZENBY**, proti sivi plesni, odmerek 1,2 l/ha, do dve tretiranji v eni rastni dobi

Pripravki na osnovi žvepla imajo tudi stransko akaricidno delovanje.

Pri pregled nasadov opazamo prerasnožitve **listnih uši** in **rastlinjakovega ščitkarja**. Zoper ščitkarja lahko uporabite **BOTANIGARD OD** (v odmerku 1,5 l/ha), **BOTANIGARD WP** (0,75 kg/ha), **NATURALIS** (v odmerku 1,5 l/ha), **SIVANTO PRIME** (v odmerku 0,625 l/ha) in zoper uši **DECIS 100 EC** (odmerek 75 ml/ha) ali **PIRIMOR 50 WG** (v odmerku 0,75 kg/ha).

Ob padavinah so napadi **polžev** še pogostejši. Svetujemo uporabo pripravkov: **BIO PLANTELLA ARION PROTI POLŽEM** (2,8 g/m²), **CELAFLOR LIMEX** (70 g/ m², registracija le do 31.05.2024), **FERRAMOL** (5 g/m²), **NATUREN BIO SREDSTVO PROTI POLŽEM** (3g/m²), **POLŽOMOR BIO VABAZATIRANJE POLŽEV** (5g/m²), **SOLABIOL PROTI POLŽEM** (5g/m²).

Pri uporabi FFS upoštevajte predpisane karence! V času cvetenja posebno pozornost namenite varstvu čebel in drugih opraševalcev. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 22.04.2024 13:21

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

[Seznam registriranih FFS](#)



MKGP-UVHVVR | Izjava o dostopnosti | FITO-INFO | NEOX s.p., 2014 | BRON d.o.o. © 2024