



43. VARSTVO MALIN - 22.04.2024 14:10 - Zaključeno



Padavine povzročijo dvig zračne vlage. Ob nekoliko višji temperaturah v tunelih postanejo pogoji ugodni za razvoj pepelovk in sive plesni. Do okužb s slednjo pride ravno v fazi cvetenja, zato za v tem času cvetoče maline priporočamo tretiranje s fungicidi:

AMYLO – X (za zmanjševanje okužb s sivo plesnijo in pepelovkami v odmerku od 1,5 do 2,5 kg/ha do največ šestkrat v eni rastni dobi, časovni interval med posameznimi tretiranjimi je 7 do 10 dni)

- **AQ -10** (za pepelovke v odmerku do 70 g na/ha do dvakrat v eni rastni dobi, časovni razmik med dvema tretiranjema je 7 do 10 dni)
- **FYTOSAVE** (za delno zmanjševanje okužb s pepelovkami v odmerku 2 l/ha do največ petkrat v eni rastni sezoni, med tretiranjimi naj preteče vsaj 7 dni)
- **KARBICURE** (za zatiranje bolezni iz družine pepelovk v odmerku 5 kg/ha do največ osemkrat v eni rastni dobi)
- **MICROTHIOL DISPERSS*** (za zatiranje pepelovk v odmerku 7,0 kg/ha do šestkrat v eni rastni dobi, ima stransko delovanje na pršice)
- **MICROTHIOL SC*** (za zatiranje ameriške kosmuljeve pepelovke v odmerku 4,0-5,0 l/ha do največ šestkrat v eni rastni dobi, ima stransko delovanje na pršice)
- **MICROTHIOL SPECIAL*** (za zatiranje pepelovk v odmerku 7 kg/ha do največ šestkrat v eni rastni dobi, ima stransko delovanje na pršice)
- **PYRUS 400 SC** (za zmanjševanje okužb s sivo plesnijo v odmerku 2 l/ha; največ dvakrat v eni rastni sezoni)
- **SCALA** (v odmerku 2 l/ha, razmak med tretiranjimi naj bo 10 dni)
- **SERENADE ASO** (za zatiranje sive plesni in ameriške kosmuljeve pepelovke na prostem v odmerku 8 l/ha, do šest tretiranj v eni rastni dobi)
- **SULFAR*** (za zatiranje pepelovk v odmerku 7 kg/ha)
- **SWTCH 62,5 WG** (za zatiranje sive plesni v odmerku 1 kg/ha do dvakrat v eni rastni dobi)
- **TAEGRO** (za zmanjševanje okužb s sivo plesnijo v odmerku 0,185-0,37 kg/ha, do desetkrat v eni rastni sezoni v najvišjem skupnem odmerku 3,7 kg/ha na rastno dobo, v časovnem intervalu 7 dni).
- **TELDOR** (za zatiranje sive plesni v odmerku 1,5 l/ha, do največ štirikrat v eni rastni sezoni v presledku 8 dni)
- **THIOVT JET*** (za zatiranje jagodne pepelovke v odmerku 4-7 kg/ha do največ štirikrat v eni rastni dobi, v 7 do 14 dnevnem presledku).
- **VITISAN** (na prostem in v zaščiteneih prostorih za zatiranje ameriške kosmuljeve pepelovke v odmerku 5 kg/ha do največ osemkrat v eni rastni dobi, v razmiku od 7 do 10 dni)

Pripravki, ki so označeni z * so na osnovi žvepla. Tretiranje z njimi se priporoča v času, ko so dnevne temperature med 15 in 25 °C, imajo pa tudi stransko delovanje na pršice.

Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

Pripravi: Imperl Ivica

Datum objave obvestila: 22.04.2024 14:10

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

Seznam registriranih FFS

