

40. VARSTVO ČEBULNIC PRED ŠKODLJIVCI - 25.04.2024 11:36 - Zaključeno



Ob pregledu posevkov čebulnic smo znamenja naleta porove zavrtalke opazili na posameznih lokacijah. Priporočamo občasno pregledovanje rastlin. Nalet muh porove zavrtalke ugotovite po značilnih svetlih točkah, nanizanih v vrsto, ki jih najdete na listih čebule, šalotke, česna, pora ali drobnjaka in so posledica poškodb, ki jih naredijo muhe med hranjenjem. Na manjših površinah lahko ukrepate preventivno in s prekrivanjem rastlin z vrtnarsko kopreno ali protiinsektno mrežo preprečite muham dostop do rastlin in kasnejše škode. Kadar je znamenj na listih veliko, lahko sklepate na močan nalet muh, ki bodo po obdobju hranjenja začele odlagati jajčeca, iz katerih se bodo razvile ličinke, ki z vrtnanjem rogov v liste čebulnic povzročajo škodo. Za zatiranje žerk (ličinke muh) lahko uporabite insekticid **Karate Zeon 5 CS** (lambda-cihalotrin (5%)) - registriran je za manjše uporabe, za zatiranje grizočih žuželk v čebuli, šalotki in česnu) ali **Benevia** (ciantraniliprol (10%)), ki je registriran za zatiranje čebulne muhe in resarjev v čebuli, šalotki in česnu. Pri pridelavi na ekološki način pridelovalci odganjajo muhe tako, da rastline čebulnic škropijo z razredčeno sirotko (razmerje z vodo 1:1). Škropljenja ponavljajo na nekaj dni oz. po vsakem dežju.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila!

Datum objave obvestila: 25.04.2024 11:36

Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: MAROLT Neja

Pripravila: **Neja Marolt**

Seznam registriranih FFS

