

43. Varstvo kapusnic pred kapusovo muho - 25.04.2024 11:53 - Zaključeno



Pridelovalce kapusnic opozarjamo, da smo v posevkih kapusnic opazili odložena jajčeca kapusove muhe. Jajčeca so ovalna, bela in odložena tik ob koreninski vrat. Priporočamo pregledovanje rastlin. Na manjših površinah lahko ukrepate preventivno in s prekrivanjem rastlin z vrtnarsko kopreno ali protiinsektno mrežo preprečite muham dostop do rastlin in kasnejše škode. Za zatiranje kapusove muhe je v cvetači, brokoliju, glavnatem zelju in brstičnem ohrovu registriran insekticid **Benevia**. Sredstvo deluje na jajčeca in vse razvojne faze ličink. Uporabite lahko tudi talni insekticid **Columbo**

0,8 MG (uporaba dovoljena v glavnatem zelju, ohrovu, listnatem ohrovu in kitajskem kapusu). Pred presajanjem sadik cvetače, zelja, brstičnega ohrova in brokolija lahko v zavarovanih prostorih za zatiranje kapusove muhe uporabite insekticid **Laser plus**. Pri tretiranju je potrebno paziti, da raztopina ne izteče iz platojev. Pred tretiranjem je potrebno liste rastline navlažiti, da raztopina lažje steče z listov v zemljo oz. substrat. Po tretiranju je potrebno liste rastline poskropiti z vodo, da se raztopina izpere z listov in steče v zemljo. V primeru takega tretiranja je uporaba a.s. spinosad dovoljena še največ enkrat v isti rastni dobi.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila!

Datum objave obvestila: 25.04.2024 11:53

Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: MAROLT Neja

Pripravila: **Neja Marolt**

Seznam registriranih FFS

