

48. Zatiranje bolezni v ozimnih žitih - 26.04.2024 15:34 - Zaključeno



Ozimni ječmeni so sedaj večinoma v obdobju razvoja klasa. V posevkih so na spodnjih listih opazna znamenja **ječmenove mrežaste pegavosti**. Po zadnjih padavinah in ohladitvi vremena so razmere za širjenje bolezni ugodne, poleg tega je obdobje od razvitega zgornjega lista in med klasenjem ječmena (BBCH 39-59) tudi primeren čas za preventivno zavarovanje posevkov pred **ječmenovo ramularijsko pegavostjo**. Bolezen se sicer začne pojavljati šele po zaključenem klasenju, najbolj v obdobju vremena z močnim sončnim obsevanjem, vendar je takrat za njeno zatiranje že prepozno. Pridelovalcem ječmena zato priporočamo, da posevke zavarujete s katerim od učinkovitih kombiniranih fungicidov kot so **Ascra xpro**, **Cayunis**, **Delaro forte**, **Elatus era**, **Priaxor EC**, **RevyCare**, **Siltra Xpro** in podobni.

Tudi posevki **ozimne pšenice** sedaj večinoma zaključujejo kolenčenje in razvijajo vrhnji list (BBCH 37-39). Zgornji trije listi so poleg klasov najbolj zaslužni za polnjenje zrn in pridelek, zato naj čim bolj dolgo ostanejo zdravi. Priporočamo, da pšenice zavarujete pred širjenjem okužb s pšenično listno pegavostjo, ko je formiran zgornji list. Uporabite katerega od kombiniranih fungicidov na osnovi aktivnih snovi z različnimi mehanizmi delovanja kot so **Ascra xpro**, **Delaro forte**, **Elatus era**, **Brivela**, **Librax**, **RevyCare**, **Siltra xpro** in podobni.

V posevkih opazujemo tudi **hrošče žitnega strgača** in poškodbe v obliki vzdolžnih črt na listih ter odložena jajčeca, ličink pa še ne, zato dodajanje insekticida za sedaj še ni potrebno. Priporočamo redno pregledovanje posevkov.

Pred uporabo natančno preberite in upoštevajte sredstvom priložena navodila!

Datum objave obvestila: 26.04.2024 15:34

Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: Urbančič Zemljič Meta

Pripravili: **Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt**

Seznam registriranih FFS

