



45. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 26.04.2024 21:51 - Zaključeno



Nasadi jablan in hrušk oblikujejo plodiče, ki presegajo premer 10 mm (71 po lestvici BBCH).

V nasadih so se med zadnjimi padavinami oblikovali pogoji za močno okužbo z **jablanovim škrlupom**. Svetujemo, da čim prej poskrbite za obnovo zaščitne fungicidne obloge. Pripravkom kot so **DELAN 700 WG** (0,75 kg/ha), **ALCOBAN** (0,75 kg/ha) ali **DELAN PRO** (2,5 l/ha) je potrebno dodati tudi sredstvo, ki ima zdravilno delovanje. Predlagamo **SCORE 250 EC** (0,2 l/ha), **REYONA** (1,3 l/10.000 m² tretirane površine listne stene; do največ 2 l/ha; deluje tudi na *jablanovo pepelovko*), **DUAXO KONCENTRAT** (1,1 l na višinski meter krošnje/ha, oz. največ 3,3 l/ha), **DIFCOR 250 EC** (0,2 l/ha), **DIFOL** (3,5 l/ha) ali **MAMTA 250 EC** (0,2 l/ha). V kolikor vam je uspelo preventivno tretiranje opraviti že v prekinitev med zadnjimi deževnimi dnevi, lahko izbirate tudi med: **CHORUS 50 WG** (0,45 kg/ha), **BATALION 450 SC** (0,7-1,0 l/ha), **ERUNE 40 SC** (1,125 l/ha), **LAITANE** (1,125 l/ha), **MYTHOS** (1,5 l/ha), **PYRAMID** (0,375 l/višinski meter, oz. največ 1,125 l/ha), **PYRUS 400 SC** (1 l/ha), **PRETIL** (1,125 l/ha), **SCALA** (1,125 l/ha). Pripravka **FABAN** (1,2 l/ha) in **CHORUS FORTE** (3,6 l/ha, oz. 2 l/10.000 m² tretirane listne površine) lahko nanesete samostojno, brez dodatnega kombiniranja. V ekološki pridelavi uporabite **CURATIO – ŽVEPLENO APNENA BROZGA** (6 l/ha na meter višine krošnje; najvišji skupni odmerek sredstva na eno tretiranje ne sme presegati 18 l/ha; namenjen varstvu pred *jablanovim škrlupom*, *listnimi pegavostmi*, *jablanovo pepelovko* in *sajavostjo in mušjo pegavostjo plodov*), ki ima dovoljenje za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin). Stransko delovanje na *škrlup* ima tudi **KARBICURE** (5 kg/ha, kalijev hidrojen karbonat; največ 5× v rastni dobi, uporaba možna v ekološki pridelavi).

Pomembno je, da poskrbite tudi za varstvo pred **jablanovo pepelasto plesnijo**. Pri občutljivih sortah ('Idared', 'Jonagold', 'Granny Smith', 'Gala', 'Elstar',...) pridejo v poštev: **REYONA** (do največ 2 l/ha), **LUNA EXPERIENCE** (0,75 l/ha), **SERCADIS PLUS** (0,72 l/ha, oz. 0,4 l/10.000 m² listne površine), **SERCADIS** (0,25 l/ha), ki delujejo tudi na *jablanov škrlup*. Dodajanje **žveplovih sredstev** je smotno, ko se dnevne temperature gibljejo nad 15 °C.

Nanos fungicida je potrebno obnoviti, ko pade več kot 25-30 mm dežja na m².

Ob otoplitvi bodite pozorni na začetek selitev kolonij **krvave uši** (prag škodljivosti je 5 – 8 % napadenih poganjkov) v višje predele dreves. Takrat je smiselno pristopiti s pripravkom **MOVENTO SC 100** (1,9 l/ha), ki hkrati deluje še na *ameriškega* in *vejicatega kaparja*, *bolšice* ter *listne hrčice*. Proti krvavi uši pride v poštev tudi **PIRIMOR 50 WG** (0,75 kg/ha).

Priporočamo, da nanos opravite v večernem času, ko je bolj mirno ozračje in ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo sredstev nevarnih za čebele obvezno poskrbite tudi za odstranitev cvetoče podrasti.

Pri tem pozorno preberite navodila in upoštevajte vse ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 26.04.2024 21:51

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

Seznam registriranih FFS

