



## 56. OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE KAPUSNIC - 09.05.2017 09:17 - Zaključeno



Posevek zelja se nahaja v različnih razvojnih stopnjah, nekje je zelje komaj posajeno (razviti 3 ali več pravih listov, 13 ~ po BBCH) do zapiranja glav (41 po BBCH).

Toplo, ter vlažno vreme ugodno vpliva na pojav **kapusovega bolhača**. V primeru prerazmnožitve lahko posevke zaščitite s pripravki: **FASTAC 100 EC** (0,075 l/ha, za brokoli, brstični ohrovt, zelje, ohrovt), **KARATE ZEON 5 CS** (0,15 l/ha, na brstičnem ohrovtu, zelju, redkvici), **DECIS 100 EC** (63 ml/ha, na zelju, cvetači, brstičnem ohrovtu) ali **NEEMAZAL -T/S** (3 l/ha, za zelje, ohrovt, brstični ohrovt, pripravek je dovoljen tudi za uporabo v ekološki pridelavi).

Začel se je razvoj prve generacije **kapusovega molja**. V primeru da opazite 10 - 30 majhnih gosenic ali 1 - 4 velike na 10 rastlin, uporabite enega izmed naslednjih pripravkov: **AFFIRM** (1,5 kg/ha, zelju, brokoliju, cvetači), **KARATE ZEON 5 CS** (0,15 l/ha, zelju), **MIMIC** (0,3-0,4 l/ha, na kapusnicah), **DECIS 100 EC** (75 ml/ha, zelju, cvetači), **STEWART** (85 g/ha, zelju, cvetači, brokoliju, rdečem zelju), **FASTAC 100 EC** (0,1 l/ha, zelju, brokoliju), **LEPINOX PLUS** (1 kg/ha, brokoliju, zelju), **NEEMAZAL-T/S** (3,0 l/ha, zelju, pripravek je dovoljen tudi za uporabo v ekološki pridelavi).

**Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev bodite še posebno pozorni na varovanje čebel in ostalih opraševalcev.**

Datum objave obvestila: 09.05.2017 09:17

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: PETERLIN Andreja

Pripravila: **Peterlin Andreja**

[Seznam registriranih FFS](#)

