



33. OBVESTILO O VARSTVU AMERIŠKIH BOROVNIC - 22.05.2017 14:53 - Zaključeno



Večina sort ameriških borovnic je že odcvetela. Kljub nestanovitnemu vremenu in pozebi je bilo okužb z borovničevo monilijo razmeroma malo, vseeno pa lahko ob zorenju plodov pričakujemo pojave mumij plodov, ki so posledica sekundarnih okužb cvetov. Ob pogostih nevihtah in plohah je potrebno nasade varovati pred glivičnimi obolenji kot so [siva plesen](#), [alternarijska pegavost](#), [pepelovka](#) in [antraknoza](#). Za varstvo nasadov lahko uporabite pripravke kot so **Signum**, **Switch 62,5 WG**, **Rovral aquaflo**, **Stroby WG**, **Teldor SC 500** ali **Serenade ASO**, slednji je primeren tudi za [ekološko](#) varstvo.

V večini nasadov je bilo zatiranje kroglastih kaparjev razmeroma uspešno, v nasadih, kjer je populacija kaparjev kljub zatiranju visoka, lahko zaradi medene rose, ki jo izločajo kaparji, pričakujemo pojav glivic sajavosti. Za preprečevanje sajavosti in ohranitev tržnega pridelka priporočamo pravočasno in redno rabo pripravka **Vitisan**, pripravek je primeren tudi za [ekološko](#) pridelavo.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije pripravkov!

Datum objave obvestila: 22.05.2017 14:53

Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: Matic Novljan

Pripravil: **Matic Novljan**, **Primož Žigon**, Uredila: **Meta Zemljč**

[Seznam registriranih FFS](#)

