

## 70. OBVESTILO ZA VARSTVO VINSKE TRTE - 24.05.2017 14:51 - Zaključeno



Vinska trta je na stopnji razvoja sedmih do osmih razprtih listov (17-18 po lestvici BBCH), hkrati so socvetja nabrekla, cvetovi se ločujejo (55-57 po lestvici BBCH).

Spremenljivo vreme omogoča ugodne razmere za okužbo s *peronosporo vinske trte*. Za redno varstvo vinogradov svetujemo preventivno delujoča sredstva: **MANFIL 75 WG** (2 kg/ha), **MANFIL 80 WP** (2 kg/ha), **PENNCOZEB 75 DG** (2 kg/ha), **PINOZEB M-45** (2 kg/ha), **MANKOZ 75 WG** (2 kg/ha), **DITHANE DG NeoTec** (2 kg/ha), **DITHANE M-45** (2 kg/ha), **FOLPAN 80 WDG** (1,25 kg/ha), **FOLPAN 50 SC** (3 l/ha), **POLYRAM DF** (2,4 kg/ha), **ANTRACOL** (2 kg/ha), **ANTRACOL WG 70** (2 kg/ha), **MILDICUT** (2 l/ha), **DAIMYO F** (2,5 l/ha), **VIDERYO F** (2,5 l/ha), **VINCYA F** (2,5 l/ha),... Uporabite lahko tudi kombinirane pripravke na osnovi fosetil-AI: **MIKAL FLASH** (4 kg/ha), **MOMENTUM F** (4 kg/ha), **ALLEATO DUO** (2 kg/ha) ali **PROFLER** (3 kg/ha). Kjer so vinogradi bolj razviti, je možna uporaba tudi drugih kombiniranih sredstev: **ELECTIS 75 WG** (1,5-1,8 kg/ha), **MELODY COMBI** (1,5 kg/ha), **AMPEXIO** (0,5 kg/ha), **PERGADO F** (1,6 kg/ha), **PERGADO D** (1,4 l/ha), **ANTRACOL COMBI WP 62,8** (2,5 kg/ha), **RIDOMIL GOLD COMBI PEPITE** (2 kg/ha), **SFINGA EXTRA WDG** (1,5 kg/ha), **VALIS F** (1,5 kg/ha), **ORVEGO** (0,8 l/ha),...

Za varstvo pred *oidijem vinske trte* priporočamo redno dodajanje žvepla: **COSAN**, **COSAVET DF**, **COSINUS**, **KUMULUS DF**, **MICROTHIOL SPECIAL**, **MOČLJIVO ŽVEPLO KARSIA DF**, **PEPELIN WG**, **POL-SULPHUR 80 WG**, **POL-SULPHUR 80 WP**, **POL-SULPHUR 800 SC**, **SYMBIOTICA FITO – TEKOČE ŽVEPLO**, **SYMBIOTICA FITO – GRANULIRANO ŽVEPLO**, **THIOVIT JET**, **VINDEX 80 WG**. Na oidij občutljivih legah pa je smiselno za varstvo uporabiti pripravke kot je **KARATHANE GOLD 350 EC** (0,5 l/ha) ali **KUSABI** (0,15 l/ha).

Kombinirana priprava **UNIVERSALIS** (2 l/ha) in **CABRIO TOP** (2 kg/ha) delujeta na obe bolezni.

**V primeru neurja s točo** je potrebno varstvo vinograda opraviti čim prej, a počakajte, da se listje osuši. Pri izbiri pripravkov dajte prednost sredstvom z aktivno snovjo folpet: **FOLPAN 50 SC**, **FOLPAN 80 WDG**, ali drugi kombinirani z a.s. folpet. Po cvetenju pridejo za ta namen v poštev tudi bakrovi pripravki.

**Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev, ki so nevarna za čebele, odstranite cvetočo podrast in opravite nanos v večernem času, ko čebele ne letajo. Pozorni bodite tudi na omejitve pri varstvu vodotokov.**

Datum objave obvestila: 24.05.2017 14:51

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

[Seznam registriranih FFS](#)

