



78. OBVESTILO ZA VARSTVO VINSKE TRTE - 30.05.2017 15:45 - Zaključeno



Vinska trta je v vinorodni deželi Posavje na večini leg prešla v cvetenje (60-65 po lestvici BBCH).

Za varstvo pred okužbami s *peronosporo vinske trte* priporočamo uporabo pripravkov kot so: **MIKAL FLASH** (4 kg/ha), **MOMENTUM F** (4 kg/ha), **ALLEATO DUO** (2 kg/ha), **PROFILER** (3 kg/ha), **MELODY COMBI** (1,5 kg/ha), **AMPEXIO** (0,5 kg/ha), **PERGADO F** (1,6 kg/ha), **PERGADO D** (1,4 l/ha), **PERGADO MZ** (2,5 kg/ha), **GETT** (2,5 kg/ha), **ANTRACOL COMBI WP 62,8** (2,5 kg/ha), **RIDOMIL GOLD COMBI PEPITE** (2 kg/ha), **RIDOMIL GOLD MZ PEPITE** (2,5 kg/ha), **MOXIMATE 725 WG** (1,9 kg/ha), **MOXIMATE 725 WP** (1,9 kg/ha), **MOXIMATE PLUS** (1,9 kg/ha), **NAUTILE DG** (2,4 kg/ha), **PROFILUX** (2 kg/ha), **SFINGA EXTRA WDG** (1,5 kg/ha), **VALIS F** (1,5 kg/ha), **ORVEGO** (0,8 l/ha), **MILDICUT** (2 l/ha), **ELECTIS 75 WG** (1,5-1,8 kg/ha),...

Toplo vreme z obilo zračne vlage omogoča ugodne razmere tudi za okužbe z *oidijem vinske trte*. Za varstvo svetujemo sredstva: **POSTALON 90 SC** (1 – 1,25 l/ha), **SERCADIS** (0,15 l/ha), **KARATHANE GOLD 350 EC** (0,5 l/ha), **TALENDO** (0,25 l/ha), **TALENDO EXTRA** (0,08-0,2 l/ha), **BALTAZAR** (0,4 l/ha), **FOLICUR EW 250** (0,4 l/ha), **KUSABI 300 SC** (0,25 l/ha), **TEBUSHA 25% EW** (0,4 l/ha), **MYSTIC 250 EC** (0,4 l/ha), **ORIUS 25 EW** (0,4 l/ha), ali **CABRIO TOP** (2 kg/ha),...

Razmike med tretiranjimi prilagodite priraščanju mladik ter količini in intenzivnosti padavin. Zaščitno oblogo obnovite na 7 do 10 dni, oz. ko pade 30 mm/m² padavin ali več.

Priporočamo pregled cvetnega nastavka in povečano pozornost na prisotnost gosenic 1. rodu *grozdnih sukačev*. V vinogradih z občutnejšimi posledicami letošnje pozebe je smiselno ukrepati s pripravki na osnovi *Bacillus thuringiensis* kot je npr. **LEPINOX PLUS** (1 kg/ha),...

V primeru neurja s točo je potrebno varstvo vinograda opraviti čim prej, a počakajte, da se listje osuši. Pri izbiri pripravkov dajte prednost sredstvom z aktivno snovjo folpet: **FOLPAN 50 SC**, **FOLPAN 80 WDG**, ali drugi kombinirani z a.s. folpet. Po cvetenju pridejo za ta namen v poštev tudi bakrovi pripravki.

Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev, ki so nevarna za čebele, odstranite cvetočo podrast in opravite nanos v večernem času, ko čebele ne letajo. Pozorni bodite tudi na omejitve pri varstvu vodotokov.

Datum objave obvestila: 30.05.2017 15:45

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

[Seznam registriranih FFS](#)