



98. OBVESTILO ZA VARSTVO NASADOV JAGOD - 20.06.2017 14:39 - Zaključeno



Po zaključenem obiranju jagod je potrebno v nasadih vzpostaviti dobre higienske razmere. Najpreprostejši pristop je košnja ter odstranitev obolelega listja. Odpadni material z ostalimi odmrliimi rastlinskimi ostanki uničite izven nasada. K zmanjšanju infekcijskega potenciala prispevajo v tem precej času precej tudi sončno obsevanje in visoke temperature.

Kljub temu je priporočljivo opraviti zaščito pred **pepelastimi plesnimi** na jagodah, za kar je primeren pripravek **THIOVIT JET** (2-4 kg/ha; deluje tudi na pršice), oz. tudi VITISAN (3 kg/ha), SYSTHANE 20 EW (0,3 l/ha pri pridelavi v zaščitenih prostorih in 0,5 l/ha na prostem), TOPAZE (0,5 l/ha), TOPAZ 100 EC (0,5 l/ha) ali AQ-10 (70 g/ha).

Svetujemo tudi rabo bakrovih pripravkov: **CUPRABLAU Z 35 WP** (1,5 kg/ha) ali **NORDOX 75 WG** (3,3 kg/ha), ki so predvideni proti **rdeči listni pegavosti jagod, beli jagodni listni pegavosti**, a imajo dobro imajo stransko delovanje tudi proti drugim **glivičnim** in **bakterijskim okužbam**. Proti listnim pegavostim je primeren tudi pripravek ROVRAL AQUAFLO (1,5-2 l/ha), ki deluje širše še na **sive plesni, alternarije** in **rizoktonije**. Na **črno pegavost jagod / antraknozo** delujeta SIGNUM (1,8 kg/ha; učinkuje še na **pepelovke** in **sivi plesni**) in ORTIVA (1 l/ha),...

V večkrat rodnih nasadih jagod skrbite predvsem za zaščito pred sivo plesnijo in upoštevajte varnostne dobe.

Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev, ki so nevarna za čebele, odstranite cvetočo podrast in opravite nanos v večernem času, ko čebele ne letajo. Pozorni bodite tudi na omejitve pri varstvu vodotokov.

Datum objave obvestila: 20.06.2017 14:39

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

[Seznam registriranih FFS](#)