



112. OBVESTILO ZA VARSTVO VINSKE TRTE - 10.07.2017 15:11 - Zaključeno



Grozdne jagode se pri vinski trti na območju vinorodne dežele Posavje združujejo v grozd. Večina jagod se med seboj že dotika (79 po lestvici BBCH).

V obdobju nestanovitnega vremena je za varstvo pred glivičnimi obolenji priporočena uporaba kombiniranih pripravkov, z več aktivnimi snovmi. Proti *peronospori vinske trte* svetujemo v vinogradih s prisotnimi okužbami sredstva:

**MOXIMATE 725 WG** (1,9 kg/ha), **MOXIMATE 725 WP** (1,9 kg/ha), **MOXIMATE PLUS** (1,9 kg/ha), **NAUTILE DG** (2,4 kg/ha), **PROFILUX** (2 kg/ha), **TANOS 50 WG** (0,4 kg/ha), **EQUATION PRO** (400 g/ha), **ACROBAT MZ WG** (2,5 kg/ha), **FORUM MZ WG** (2,5 kg/ha), **GALBEN M** (2,5 kg/ha), **SFINGA EXTRA EDG** (2 kg/ha), **TWINGO** (3 kg/ha), **PERGADO MZ** (2,5 kg/ha), **GETT** (2,5 kg/ha), **AMPEXIO** (0,5 kg/ha), **PERGADO F** (1,6 kg/ha), **PERGADO D** (1,4 l/ha), **ANTRACOL COMBI WP 62,8** (2,5 kg/ha), **RIDOMIL GOLD MZ PEPITE** (2,5 kg/ha), **RIDOMIL GOLD COMBI PEPITE** (2 kg/ha), **FORUM STAR** (1,6 kg/ha), **SFINGAEXTRA WDG** (1,5 kg/ha), **VALIS F** (1,5 kg/ha), **ORVEGO** (0,8 l/ha), **ENERVIN** (2,5 kg/ha), **MILDICUT** (2 l/ha), **ELECTIS 75 WG** (1,5-1,8 kg/ha)... V vinogradih brez zaznanih okužb lahko pristopate tudi z enostavnimi preventivnimi pripravki. Pri sortah z bujno rastjo ('Modra frankinja', 'Žametna črnina') je po zaključenem cvetenju občasno smiselno uporabiti tudi sredstva v kombinaciji z bakrom: **PERGADO C** (4-5 kg/ha), **AMALINE FLOW** (2,25 l/ha), **CURZATE C EXTRA** (2 kg/ha), **GALBEN C** (0,4-0,5 % konc.),...

Soparno vreme omogoča ugodne razmere tudi za okužbe z *oidijem vinske trte*. Za varstvo svetujemo sredstva: **TALENDO EXTRA** (0,08-0,2 l/ha), **FALCON EC 460** (0,4 l/ha), **DYNALI** (0,65 l/ha), **SERCADIS** (0,15 l/ha), **BALTAZAR** (0,4 l/ha), **POSTALON 90 SC** (1 – 1,25 l/ha), **NATIVO 75 WG** (0,16 kg/ha), **KARATHANE GOLD 350 EC** (0,5 l/ha), **TALENDO** (0,25 l/ha), **KUSABI 300 SC** (0,25 l/ha), **FOLICUR EW 250** (0,4 l/ha), **TEBUSHA 25% EW** (0,4 l/ha), **MYSTIC 250 EC** (0,4 l/ha), **ORIOUS 25 EW** (0,4 l/ha), **CRYSTAL** (0,2 l/ha), **VITISAN** (16 kg/ha)...

**Razmike med tretiranjimi prilagodite razvoju bolezni, priraščanju mladik ter količini in intenzivnosti padavin. Kjer je bolezen močnejše prisotna, je potrebno zmanjšati razmik med nanosi. Zaščitno oblogo sicer obnovite na 7 do največ 10 dni, oz. ko pade 30 mm/m<sup>2</sup> padavin ali več.**

**V primeru neurja s točo** je potrebno varstvo vinograda opraviti čim prej, a počakajte, da se listje osuši. Pri izbiri pripravkov dajte prednost sredstvom z aktivno snovjo **folpet**: **Folpan 50 SC**, **Folpan 80 WDG**, **Emendo F**, **Forum Star**, **Melody Combi WG 65,3**, **Pergado F**, **Ridomil Gold Combi Pepite**, **Sfinga Extra**, **Twingo**, **Valis F**, **Viderdyo F**. Za ta namen pridejo v poštev **tudi bakrovi pripravki**.

**Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev, ki so nevarna za čebele, odstranite cvetočo podrast in opravite nanos v večernem času, ko čebele ne letajo. Pozorni bodite tudi na omejitve pri varstvu vodotokov.**

Datum objave obvestila: 10.07.2017 15:11

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

[Seznam registriranih FFS](#)