



128. OBVESTILO ZA VARSTVO VINSKE TRTE - 07.08.2017 16:05 - Zaključeno



Vinsko trto je vročinsko obdobje spodbudilo k zgodnjemu začetku zorenja. Pri sortah 'Modra frankinja' in 'Žametna črnina' se grozdne jagode barvajo in mehčajo. Podobno se pri beli sorti 'Kraljevina' jagode svetlijo in mehčajo (81-85 po lestvici BBCH).

Varstvo pred **peronosporo vinske trte** je smiselno zaključiti s tretiranjem v naslednjih dneh s pripravki kot so: **DITHANE DG NEOTEC** (2 kg/ha; 28 dni), **DITHANE M-45** (2 kg/ha; 28 dni), **MANKOZ 75 WG** (2 kg/ha; 28 dni), **PENNCOZEB 75 DG** (2 kg/ha; 28 dni), **DAIMYO F** (2,5 l/ha; 28 dni), **VIDERYO F** (2,5 l/ha; 28 dni), **VINCYA F** (2,5 l/ha; 28 dni), **MILDICUT** (4 l/ha; 21 dni), **REVUS** (0,6 l/ha; 21 dni; do začetka zorenja BBCH-81), **FOLPAN 50 SC** (2 l/ha; 28 dni za vinsko grozdje), **FOLPAN 80 WDG** (1,25 kg/ha; 35 dni za vinsko grozdje). Kjer je rast prebujna, lahko za zaključna tretiranja ob upoštevanju karence uporabite tudi **PRIPRAVKE NA OSNOVI BAKRA**. Pri aromatičnih sortah upoštevajte njihov možno neugoden vpliv na razvoj arome.

Proti **oidiji vinske trte** dodajte **SREDSTVO NA OSNOVI ŽVEPLA** (3-4 kg/ha). Pri obsežnejših okužbah je še vedno možna tudi uporaba pripravkov **DYNALI** (0,65 l/ha; 21 dni), **NATIVO 75 WG** (0,16 kg/ha; 14 dni), **LUNA EXPERIENCE** (0,5 l/ha; 28 dni za vinsko grozdje), **SERCADIS** (0,15 l/ha; 35 dni), **KARATHANE GOLD 350 EC** (0,6 l/ha; 21 dni za vinsko grozdje), **BALTAZAR** (0,4 l/ha; 14 dni), **MISHA 20 EW** (0,23 l/ha; 14 dni), **TOPAS 100 EC** (0,3 l/ha; 28 dni) ali **TOPAZE** (0,3 l/ha; 28 dni), **ORIOUS 25 EW** (0,4 l/ha; 14 dni za vinsko grozdje), **TEBUSHA 25% EW** (0,4 l/ha; 14 dni), **KUSABI 300 SC** (0,3 l/ha; 28 dni), **TALENDO** (0,25 l/ha; 28 dni), **MYSTIC 250 EC** (0,4 l/ha; 42 dni), **FALCON EC 460** (0,4 l/ha; 35 dni), **CRYSTAL** (0,2 l/ha; 30 dni za vinsko in 21 dni namizno grozdje), ...

Ob potrebi za varstvo pred **sivo plesnijo** bomo pripravili dodatne nasvete.

V primeru neurja s točo je potrebno varstvo vinograda opraviti čim prej, a počakajte, da se listje osuši. Pri izbiri pripravkov dajte **prednost sredstvom z aktivno snovjo folpet ali baker**. Poškodovano grozdje je v primeru toče potrebno pred razvojem gnilobe zaščititi tudi **z botriticidnimi pripravki**.

Lastnike vinogradov hkrati obveščamo, da Služba za varstvo rastlin na KGZS – Zavodu Novo mesto na podlagi javnih pooblastil pregleduje vinograde na prisotnost karantenske zlate trsne rumenice. Sumljive trse vzorčimo in pri tem označimo z belim lepljivim trakom ter nalepko 'Uradni vzorec MKGP'. Po opravljeni laboratorijski analizi bodo lastniki obveščeni o rezultatu preiskave.

Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev, ki so nevarna za čebele, odstranite cvetočo podrast in opravite nanos v večernem času, ko čebele ne letajo. Pozorni bodite tudi na omejitve pri varstvu vodotokov.

Datum objave obvestila: 07.08.2017 16:05

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

[Seznam registriranih FFS](#)

