



94. OBVESTILO O VARSTVU KAPUSNIC PRED ŠKODLJIVCI - 11.09.2017 11:46 - Zaključeno



Belini

Na opazovanih lokacijah beležimo povečan pojav gosenic kapusovega belina (*Pieris brassicae*) oz. repnega belina (*Pieris rapae*). Pridelovalce kapusnic opozarjamo, da pregledajo svoje nasade in ob pojavu gosenic belinov uporabijo enega od insekticidov: **Affirm** (1,5 kg/ha; zelje, cvetača, brokoli; največ 3-krat v eni rastni dobi; K = 3 dni), **Bulldock EC 25** (0,3-0,5 L/ha; zelje, kitajsko zelje, ohrovt; največ 2-krat v eni rastni sezoni; K = 7 dni), **Decis 100 EC** 75 ml/ha (zelje, brstični ohrovt, cvetača; največ 1-krat v eni rastni dobi; K = 7 dni), **Delfin WG** (0,5 kg/ha; kapusnice; uporaba največ 3-krat v eni rastni sezoni; K = ni potrebna), **Fastac 100 EC** (0,1 L/ha; brokoli, brstični ohrovt, zelje, ohrovt; uporaba največ 2-krat v eni rastni dobi; K = 14 dni), **Karate Zeon 5 CS** (0,2 L/ha za brstični ohrovt in zelje ter odmerek 0,15 L/ha za kitajsko zelje in cvetačo; kitajsko zelje največ 1-krat v eni rastni sezoni; brstični ohrovt, zelje, cvetača največ 2-krat v eni rastni sezoni; K = 7 dni za kitajsko zelje in cvetačo ter K = 21 dni za zelje in brstični ohrovt), **Karis 10 CS** (50 ml/ha; brstični ohrovt, zelje, cvetača, ohrovt, brokoli; največ 2-krat v eni rastni sezoni; brstični ohrovt in zelje K = 21 dni, za ohrovt in brokoli K = 10 dni, za cvetačo K = 7 dni), **Mimic** (0,3-0,4 L/ha; kapusnice; uporaba 1-krat letno; K = 14 dni), **Neemazal – T/S** (3 L/ha; zelje, ohrovt, brstični ohrovt; največ 3-krat v eni rastni dobi; K = 3 dni), **Steward** (85 g/ha; brokoli, brstični ohrovt, cvetača, zelje, rdeče zelje; uporaba največ 3-krat v eni rastni dobi; K = 3 dni, za brstični ohrovt K = 28 dni). **Pred škropljenjem pozorno preberite navodila za uporabo in ob škropljenju upoštevajte vse ukrepe za varovanje čebel in voda, kateri so navedeni v navodilih za uporabo FFS!**

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN

Kapusov molj

V zadnjih dneh opažamo v nasadih kapusnic večjo prisotnost kapusovega molja (*Plutella xylostella*). V primeru preseženega praga škodljivosti (1 gosenica/rastlino) priporočamo uporabo enega od sledečih insekticidov: **Affirm** (1,5 kg/ha; zelje, cvetača, brokoli; največ 3-krat v eni rastni dobi; K = 3 dni), **Decis 100 EC** (75 ml/ha; brstični ohrovt, cvetača, zelje; največ 1-krat v eni rastni dobi; K = 7 dni), **Fastac 100 EC** (0,1 L/ha; brokoli, brstični ohrovt, zelje, ohrovt; največ 2-krat v eni rastni dobi; K = 14 dni), **Karate Zeon 5 CS** (0,15 L/ha; brstični ohrovt, zelje, kitajsko zelje, cvetača; kitajsko zelje največ 1-krat v eni rastni sezoni; brstični ohrovt, zelje, cvetača največ 2-krat v eni rastni sezoni; K = 7 dni za kitajsko zelje in cvetačo ter K = 21 dni za zelje, brstični ohrovt), **Lepinox plus** (1 kg/ha; brstični ohrovt, brokoli, ohrovt, zelje, kitajsko zelje; K ni potrebna), **Mimic** (0,3 - 0,4 L/ha; kapusnice; uporaba največ 1-krat letno; K = 14 dni), **Neemazal-T/S** (3 L/ha; zelje, ohrovt, brstični ohrovt; največ 3-krat v eni rastni dobi; K = 3 dni), **Steward** (85 g/ha; brokoli, brstični ohrovt, cvetača, zelje, rdeče zelje; največ 3-krat v eni rastni dobi; K = 3 dni; za brstični ohrovt K = 28 dni). Affirm, Mimic, Neemazal – T/S, Karate zeon in Steward zatirajo tudi kapusovo sovko.

LEGENDA: K = karenca. **Pred škropljenjem pozorno preberite navodila za uporabo in ob škropljenju upoštevajte vse zakonske predpise o varovanju čebel, upoštevajte predpisane varnostne pasove do voda in karenčne dobe!**

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN

Datum objave obvestila: 11.09.2017 11:46

Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Objavil/a: SILVO Zveplan

Pripravil: **Silvo Zveplan**

[Seznam registriranih FFS](#)