

## 96. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 19.10.2017 10:46 - Zaključeno



V nasadih in posameznih sortah, kjer ste že opravili eno škropljenje z UREO je listje v večji meri obarvano in začenja intenzivneje odpadati. V ostalih nasadih in sortah, pa pričakujemo intenzivnejše odpadanje listja, ko bo nastopilo obdobje hladnega in deževnega vremena.

Ob odpadanju listja na poganjkih nastajajo številne odprte rane, na katerih se v ugodnih vremenskih razmerah lahko naselijo bakterije in glive, bodisi v obliki težko opaznih rakastih ran ali v obliki nevidne latentne okužbe, ki predstavljajo nova žarišča za širjenje bolezni v naslednjem letu.

V nasadih jablan in hrušk, kjer imate težave z obvladovanjem glivične bolezni **jablanovega raka** in nasadih, ki so bila okužena (oz. se nahajajo na okuženem območju) z bakterijo **Erwinia amylovora**, povzročiteljico hruševega ožiga priporočamo, **da v jesenskem času opravite škropljenje jablan in hrušk z bakrovimi pripravki** (kot preventiven ukrep ga lahko opravite tudi v vseh ostalih nasadih ter ohišnicah jablan in hrušk).

**Glede na toplo in suho prvo ter drugo dekada oktobra zadostuje, da opravite eno škropljenje, ko bo listje intenzivno odpadalo oziroma, ko bo odpadla večina listja.**

Škropljenje opravite z enim od pripravkov na osnovi bakra kot so: **Biotip bakrov fungicid plus** (0,75 % konc.), **Cuprablau Z 35 WP** (2,5 kg/ha za zatiranje hruševega ožiga – 3 kg/ha za zatiranje jablanovega škrlupa) ali **Nordox 75 WG** (1,6 kg/ha), ki pa je registriran samo za omejevanje okužb z jablanovim rakom.

*Pazite, da z bakrovimi pripravki ne škropite pri zelo nizkih temperaturah. Te naj bodo vsaj enake ali višje od 5 °C.*

Datum objave obvestila: 19.10.2017 10:46

Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus

Pripravila: **Alenka Ferlež-Rus**

[Seznam registriranih FFS](#)

