

Jugovzhodna Slovenija - Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto / Oljna ogrščica
/ 15. OBVESTILO ZA ZATIRANJE KLJUNOTAJEV V OLJNI OGRŠČICI

15. OBVESTILO ZA ZATIRANJE KLJUNOTAJEV V OLJNI OGRŠČICI - 10.04.2018 13:03 -
Zaključeno



Fenološki razvoj oljne ogrščice

Oljna ogrščica se trenutno nahaja v razvojni stopnji podaljševanja stebela (30 – 39 po BBCH).

Zatiranje škodljivcev repičnega kljunotaja (*Ceutorhynchus napi*)

Pri kontroli posevkov smo že opazili prve pojave **repičnega kljunotaja (*Ceutorhynchus napi*)**, ki pa ne presegajo praga škodljivosti 2 - 4 hroščke na 10 rastlin oz. 5 hroščev na dan na rumeno posodo.

Pridelovalcem priporočamo, da pregledajo posevke. V primeru, da opazite presežen prag škodljivosti priporočamo uporabo enega izmed naslednjih pripravkov: **DASKOR 440** (0,625 l/ha), **DECIS 2,5 EC** (0,3 L/ha), **DECIS 100 EC** (63 ml/ha), **EVURE** (0,625 l/ha), **FASTAC 100 EC** (0,1 L/ha), **KAISO EG** (150 g/ha), **KARATE ZEON 5 CS** (0,15L/ha), **MAVRIK 240 EW** (0,2 L/ha), **POLECI** (0,3 L/ha), **SPARMIERO** (0,075 l/ha).

Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev bodite še posebno pozorni na varovanje čebel in ostalih opraševalcev.

Datum objave obvestila: 10.04.2018 13:03

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: RODIČ Karmen

Uredila: **Karmen Rodič**

[Seznam registriranih FFS](#)

