

60. VARSTVO BRESKEV - 23.05.2018 16:12 - Zaključeno



Breskev je po razvoju na stopnji sekundarnega odpadanja plodičev (73 po lestvici BBCH).

V nestanovitnem vremenu je nevarnost okužbe plodov z **breskovim škrlupom** precejšnja. Za varstvo pred **breskovo oz. marelično pepelovko** lahko uporabite sredstva na osnovi žvepla: **COSAN**, **KUMULUS DF**, **PEPELIN WG**, **THIOVIT JET**, **VINDEX 80 WG**, **MICROTHIOL SPECIAL** v odmerku 5-7,5 kg/ha, oz. le na breskvah **POL-SULPHUR 800 SC** ali **SYMBIOTICA FITO – TEKOČE ŽVEPLO** (oba v odmerku 6 l/ha), ki imajo učinek tudi proti škrlupu.

Pridelovalcem priporočamo, da zaščitite pridelek tudi pred **breskovim zavijačem** in **breskovim moljem**. Uporabite lahko: **CORAGEN** (20 ml/hl), **LEPINOX PLUS** (1 kg/ha; tudi v ekološki pridelavi), **AGREE WG** (1 kg/ha; tudi v ekološki pridelavi) in **LASER PLUS** (0,25 l/ha; tudi v ekološki pridelavi),...

Pred tretiranjem s FFS odstranite morebitno cvetočo podrast ter preprečite zanašanje na sosednje površine. Priporočamo, da nanos FFS opravite v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 23.05.2018 16:12

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

[Seznam registriranih FFS](#)