



71. VARSTVO VINSKE TRTE - 15.06.2018 15:42 - Zaključeno



Vinska trta na območju vinorodne dežele Posavje oblikuje grozdiče, kjer so jagode med velikostjo prosenih zrn in graha (73 - 74 po lestvici BBCH).

Vinogradnikom priporočamo pozornost na varstvu pred **oidijem vinske trte**. Morebitne okužbe grozdičev preprečite z uporabo pripravkov kot so: **NATIVO 75 WG** (0,16 kg/ha), **LUNA EXPERIENCE** (0,5 l/ha), **TALENDO EXTRA** (0,13 – 0,3 l/ha), **BALTAZAR** (0,4 l/ha), **DYNALI** (0,65 l/ha), **POSTALON 90 SC** (1 - 1,25 l/ha), **KARATHANE GOLD 350 EC** (0,5 l/ha), **FALCON EC 460** (0,4 l/ha), **CUSTODIA** (0,7 l/ha), **DOMARK 100 EC** (0,3 l/ha), **SERCADIS** (0,15 l/ha), **FOLICUR EW 250** (0,4 l/ha), **TEBUSA 25% EW** (0,4 l/ha), **KUSABI** (0,25 l/ha), **MISHA 20 EW** (0,23 l/ha), **MYSTIC 250 EC** (0,4 l/ha), **ORIU 25 EW** (0,4 l/ha), **TALENDO** (0,25 l/ha),... V ekološki pridelavi je poleg pripravkov na osnovi žvepla primerna raba sredstev: **VTISAN** (12 kg/ha) in **AQ 10** (35 g/ha).

Proti **peronospori vinske trte** nadaljujte zaščito s sredstvi s kombiniranim delovanjem kot so: **FORUM MZ WG** (2,5 kg/ha), **MOXIMATE 725 WG** (1,9 kg/ha), **MOXIMATE 725 WP** (1,9 kg/ha), **MOXIMATE PLUS** (1,9 kg/ha), **ACROBAT MZ WG** (2,5 kg/ha), **NAUTILE DG** (2,4 kg/ha), **PROFILUX** (2 kg/ha), **TANOS 50 WG** (0,4 kg/ha), **EQUATION PRO** (400 g/ha), **GALBEN M** (2,5 kg/ha), **SFINGA EXTRA WDG** (2 kg/ha), **TWINGO** (3 kg/ha), **PERGADO MZ** (2,5 kg/ha), **GETT** (2,5 kg/ha), **AMPEXIO** (0,5 kg/ha), **PERGADO F** (1,6 kg/ha), **PERGADO D** (1,4 l/ha), **RIDOMIL GOLD MZ PEPITE** (2,5 kg/ha), **RIDOMIL GOLD COMBI PEPITE** (2 kg/ha), **FORUM STAR** (1,6 kg/ha), **SFINGA EXTRA WDG** (1,5 kg/ha), **VALIS F** (1,5 kg/ha), **ORVEGO** (0,8 l/ha), **ENERVIN** (2,5 kg/ha), **MILDICUT** (3 l/ha), **ELECTIS 75 WG** (1,5-1,8 kg/ha). Možna je tudi raba sredstev na osnovi Al-fosetil: **MIKAL PREMIUM F** (3 kg/ha), **MOMENTUM TRIO** (3kg/ha), **MIKAL FLASH** (4 kg/ha) ali **MOMENTUM F** (4 kg/ha), ki jih je potrebno uporabiti 3x zaporedoma v razmiku 7-10 dni. Slednja dva delujeta le preventivno. V ekološki pridelavi pridejo v poštev pripravki na osnovi bakra, pri čemer upoštevajte, da njihova uporaba umirja bujnost.

V primeru neurja s točo varstvo vinske trte s fungicidi opravite čim prej, a počakajte, da se listje osuši. Prvi cilj je razkužitev in osušitev poškodovanega tkiva, s čimer patogenom otežimo vstop v rastlino. Pri izbiri pripravkov dajte prednost sredstvom z aktivno snovjo **folpet** (FOLPAN 50 SC, FOLPAN 80 WDG, FOLLOW 80 WG ali drugim kombiniranim pripravkom z a.s. folpet: mendo F, Forum Star, Melody Combi WG 65,3, Mikal Flash, Mikal Premium, Momentum, Momentum Trio, Pergado F, Ridomil Gold Combi Pepite, Sfinga Extra, Twingo, Valis F, Viderdyo F), oziroma **pripravkom na osnovi bakra** (AMALINE FLOW (2,25 l/ha), BADGE WG (2,5 kg/ha), BIOTIP BAKROV FUNGICID PLUS (v 0,75 % konc.), CUPRABLAU Z 35 WG (3 kg/ha), CUPRABLAU Z 35 WP (3 kg/ha), CUPRABLAU Z 50 WP (2 kg/ha), CUPRABLAU Z ULTRA WP (1,8 kg/ha), CUPROXAT (5,3 l/ha), CURZATE C EXTRA (2 kg/ha), KOCIDE 2000 (2 kg/ha), NORDOX 75 WG (1,6 kg/ha), PERGADO C (4-5 kg/ha)). Kjer je les hujše poškodovan, dajemo pozornost preparatom za dvigovanje odpornosti rastlin na osnovi alg ali aminokislin šele v času regeneracije. V poškodovanih vinogradih je za vzpostavitev ugodnega mikrobiološkega ravnovesja, za manjše uporabe, tehtna tudi raba SERENADE ASO (8 l/ha)

Razmike med tretiranjmi v tem obdobju prilagodite intenzivnosti padavin (ko pade več kot 30 mm, je zaščitna obloga že oslABLJENA), oz. na 7 - 10 dni.

Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 15.06.2018 15:42

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

[Seznam registriranih FFS](#)