



77. VARSTVO VINSKE TRTE - 10.07.2018 10:00 - Zaključeno



Vinska trta na območju vinorodne dežele Posavje oblikuje grozdice, s stikanjem grozdnih jagod (79 po lestvici BBCH).

Vremenske razmere so s pogostimi padavinami za razvoj glivičnih obolenj izredno ugodne.

Okužbe s **peronosporo vinske trte** se razvijajo predvsem na vrhovih in mlajših listih, a najdemo jih tudi na grozdih.

Priporočamo, da pazno poskrbite za zaščito grozdičev. Svetujemo uporabo sredstev: **ACROBAT MZ WG** (2,5 kg/ha), **EQUATION PRO** (400 g/ha), **ANTRACOL COMBI 62,8** (2,5 kg/ha), **RIDOMIL GOLD MZ PEPITE** (2,5 kg/ha), **RIDOMIL GOLD COMBI PEPITE** (2 kg/ha), **FORUM STAR** (1,6 kg/ha), **FORUM MZ WG** (2,5 kg/ha), **SFINGA EXTRA WDG** (1,5 kg/ha), **VALIS F** (1,5 kg/ha), **EMENDO F** (1,5 kg/ha), **MOXIMATE 725 WG** (1,9 kg/ha), **MOXIMATE 725 WP** (1,9 kg/ha), **MOXIMATE PLUS** (1,9 kg/ha), **NAUTILE DG** (2,4 kg/ha), **PROFILUX** (2 kg/ha), **TANOS 50 WG** (0,4 kg/ha), **SFINGAEXTRA WDG** (2 kg/ha), **TWINGO** (3 kg/ha), **PERGADO MZ** (2,5 kg/ha), **GETT** (2,5 kg/ha), **AMPEXIO** (0,5 kg/ha), **PERGADO F** (1,6 kg/ha), **PERGADO D** (1,4 l/ha), **ORVEGO** (0,8 l/ha), **ENERVIN** (2,5 kg/ha), **MILDICUT** (3 l/ha), **ELECTIS 75 WG** (1,5-1,8 kg/ha), **VIDERYO F** (2,5 l/ha), **VINCYAF** (2,5 l/ha), **DAIMYO F** (2,5 l/ha), **CYMBAL** (0,25 kg/ha), ... V vinogradih, kjer je rast prebujna, lahko uporabite tudi **sredstva v kombinaciji z bakrom**: **AMALINE FLOW** (2,25 l/ha), **CURZATE C EXTRA** (2 kg/ha), **PERGADO C** (4-5 kg/ha). V ekološki pridelavi pridejo v poštev **PRIPRAVKI NA OSNOVI BAKRA**, pri čemer upoštevajte, da njihova uporaba umirja bujnost.

Zaščitno oblogo obnovite najkasneje na 10 dni, oz. ko pade 30 mm/m<sup>2</sup> padavin ali več.

V primeru, da okužb kljub periodičnemu varstvu ne morete obvladati, predlagamo dve zaporedni tretiranji na 3-4 dni, s katerim prekinete razvojni krog glive.

Vinogradnikom priporočamo pozornost na varstvu pred **oidijem vinske trte**. Morebitne okužbe grozdičev preprečite z uporabo pripravkov kot so: **NATIVO 75 WG** (0,16 kg/ha), **LUNA EXPERIENCE** (0,5 l/ha), **TALENDO EXTRA** (0,13 – 0,3 l/ha), **BALTAZAR** (0,4 l/ha), **DYNALI** (0,65 l/ha), **POSTALON 90 SC** (1 - 1,25 l/ha), **KARATHANE GOLD 350 EC** (0,5 l/ha), **FALCON EC 460** (0,4 l/ha), **CUSTODIA** (0,7 l/ha), **DOMARK 100 EC** (0,3 l/ha), **SERCADIS** (0,15 l/ha), **STAR TEBUKONAZOL** (0,4 l/ha), **TEBUSHA 25% EW** (0,4 l/ha), **MISHA 20 EW** (0,23 l/ha), **FOLICUR EW 250** (0,4 l/ha), **KUSABI** (0,25 l/ha), **MYSTIC 250 EC** (0,4 l/ha), **ORIOUS 25 EW** (0,4 l/ha), **TALENDO** (0,25 l/ha),... V ekološki pridelavi je poleg pripravkov na osnovi žvepla primerna raba sredstev: **VTISAN** (12 kg/ha) in **AQ 10** (35 g/ha).

Zatiranje gosenic drugega rodu **grozdnih sukačev** predvidite v zadnji dekadi meseca junija s pripravki na osnovi *Bacillus thuringiensis* kot so: **LEPINOX PLUS** (1 kg/ha), **AGREE WG** (1 kg/ha), **DELFIN WG** (0,75 kg/ha), ki so primerni tudi za ekološko pridelavo, oziroma sredstvi: **AFFIRM** (1,5 kg/ha), **CORAGEN** (150 ml/ha),...

**Zatiranje ameriškega škržatka, prenašalca zlate trsne rumenice:**

V vinogradih za pridelavo grozdja, brajda in ohišnicah v vinorodni deželi Posavje, **kjer za prvo tretiranje ni bil uporabljen** pripravek **ACTARA 25 WG**, oz. se na rumene lepljive plošče v 7 – 10 dneh ulovijo štirje ali več odraslih škržatkov, je potrebno v naslednjih dneh opraviti drugo tretiranje proti **ameriškemu škržatku**. Tri do pet rumenih lepljivih plošč na hektar namestite v vinograde od začetka julija dalje in jih menjate na 2 do 3 tedne. Uporabite pripravek **ACTARA 25 WG** v odmerku 200 g/ha. Pripravki kot sta **Reldan 22 EC** ali **Pyrinex 22 EC** na razmejenem območju (celotno območje JV Slovenije) ne zadoščata kot karantenski ukrep.

V ekološki pridelavi je potrebno opraviti dve tretiranji, razen če po prvem tretiranju s spremljanjem ulova ugotovite, da ulov odraslih škržatkov ne presega 4 osebkov na rumeno lepljivo ploščo na teden. V takem primeru tretiranja ni potrebno ponoviti, sicer uporabite enega izmed pripravkov na podlagi piretrina (**FLORA VERDE** ali **BIOTIP FLORAL**) v odmerku 0,16 l/ha z dodatkom 0,5% ogrščičnega olja.

V matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah je potrebno opraviti vsaj dve tretiranji.

V matičnih vinogradih uporabite pripravek **ACTARA 25 WG**, **DECIS 2,5 EC** (0,5 l/ha) ali pripravek na osnovi piretrina. Slednja zatirata tudi **grozodne sukače**. Če se na rumene lepljive plošče tudi po drugem tretiranju lovijo odrasli škržatki (4 ali več na teden), je konec julija / I. dekadi avgusta potrebno opraviti še tretje tretiranje (z istim naborom sredstev).

V matičnjakih uporabite **ACTARA 25 WG** ali **DECIS 2,5 EC** ter v primeru nadaljnega lova škržatkov na rumene lepljive plošče (4 ali več) predvidite ponovno tretje tretiranje.

V trsnicah uporabite **ACTARA 25 WG**, **DECIS 2,5 EC** ali **DECIS** ter v primeru nadaljnega lova škržatkov na rumene lepljive plošče (4 ali več) predvidite ponovno tretje tretiranje.

***Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. Vsa fitofarmaceutska sredstva je treba uporabljati v skladu z navodili za uporabo in navedbami na etiketi. Vsa sredstva, ki jih uporabljamo za zatiranje ameriškega škržatka, so nevarna za čebele. Cvetično podrast je potrebno pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih. Upoštevajte navodila za varovanje vodnih virov in predpisane razdalje od voda I. in II. reda.***

Datum objave obvestila: 10.07.2018 10:00

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

[Seznam registriranih FFS](#)

