

64. OBVESTILO O VARSTVU PARADIŽNIKA PRED BOLEZNIMI - 12.07.2018 09:08 - Zaključeno



Paradižnikova/krompirjeva plesen in črna listna pegavost paradižnika

V zadnjih dneh so zelo ugodni pogoji za širjenje paradižnikove plesni (*Phytophthora infestans*) in nekoliko manj ugodni pogoji za širjenje črne listne pegavosti paradižnika (*Alternaria solani*). Tudi pri gojenju paradižnika v zavarovanih prostorih smo tam, kjer imajo slabo zračene prostore oziroma jim v te prostore zamaka, že našli pege paradižnikove plesni. V tem času priporočamo uporabo sistemskih fungicidov, kateri delujejo na obe bolezni hkrati in imajo kratko karenco: **Acrobat MZ WG** ali **Forum MZ WG** (na prostem in v zaščiteneh prostorih; 2 kg/ha = (20 g na 100 m² pri porabi 2 do 10 L vode), K = 3 dni, največ 3 krat v eni rastni sezoni), **Gett** (pridelava na prostem; 2,5 kg/ha = (25 g na 100 m² pri porabi 4 do 10 L vode), K = 3 dni, največ 4 krat v eni rastni sezoni), **Ortiva** ali **Zaftra AZT 250 SC** (na prostem in v zaščiteneh prostorih; 1 L/ha = (10 mL na 100 m² pri porabi 4 do 12 L vode), K = 3 dni, v zaščitenem prostoru največ 2 krat, na prostem največ 3 krat v eni rastni sezoni na istem zemljišču). **Ortiva** in **Zaftra** delujeta tudi na paradižnikovo pepelovko (*Leveillula taurica*) in na pepelovke (*Erysiphe* sp.). **Pergado MZ** (pridelava na prostem; 2,5 kg/ha = (25 g na 100 m² pri porabi 10 L vode), K = 3 dni, največ 4 krat v eni rastni sezoni).

Dosledno upoštevajte karencne dobe in vsa opozorila navedena v navodilih za uporabo!

Rjava žametna paradižnikova pegavost

Pri pridelavi paradižnika v zaščiteneh prostorih opažamo pojav visoke zračne vlažnosti predvsem v nočnem in dopoldanskem času in posledično širjenje rjave žametne paradižnikove pegavosti (*Cladosporium fulvum*). Pridelovalcem paradižnika proti omenjeni bolezni priporočamo uporabo fungicidov: **Mavita 250 EC** ali **Score 250 EC** (pridelava na prostem; 0,5 L/ha = (5 mL na 100 m² pri porabi 4 do 8 L vode), K = 7 dni, največ 2 krat v eni rastni sezoni), oba fungicida delujeta tudi na črno listno pegavost paradižnika (*Alternaria solani*) in tudi na paradižnikovo pepelovko (*Leveillula taurica*).

Dosledno upoštevajte karencne dobe in vsa opozorila navedena v navodilih za uporabo!

Datum objave obvestila: 12.07.2018 09:08

Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Objavil/a: SILVO Zveplan

Pripravil: **Silvo Zveplan**

Seznam registriranih FFS

