



Celjska in Koroška regija - Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije / Krompir

/ 66. OBVESTILO O DESIKACIJI-SUŠENJU KROMPIRJEVE CIME IN PLEVELOV PRED IZKOPOM KROMPIRJA

## 66. OBVESTILO O DESIKACIJI-SUŠENJU KROMPIRJEVE CIME IN PLEVELOV PRED IZKOPOM KROMPIRJA - 12.07.2018 14:17 - Zaključeno



Dva tedna pred predvidenim izkopom lahko opravite desikacijo - krompirjevo cimo in plevele lahko poškropite z enim od herbicidov na osnovi (dikvata) **Reglone 200 SL** ali **Dessicash 200 SL**. Oba herbicida, **Reglone 200 SL** in **Dessicash 200 SL**, se uporabljata kot neselektivna herbicida na semenskem in jedilnem krompirju za sušenje (desikacijo) krompirjevke. Sredstvi delujeta na zelene dele rastlin krompirja hitro in že v nekaj dneh posušita krompirjevko in plevel (proti dežju sta odporna že 15 minut po škropljenju). **Reglone 200 SL** se za sušenje krompirjevke jedilnega krompirja uporablja v odmerku 2,5 L/ha (25 ml na 100 m<sup>2</sup>), za sušenje krompirjevke semenskega krompirja v odmerku 4 L/ha (40 ml na 100 m<sup>2</sup>), vedno ob porabi vode 300-400 L/ha (3-4 L na 100 m<sup>2</sup>), odvisno od bujnosti krompirjevke. V primeru, da je krompirjeva plesen prisotna v nasadu, lahko 14 dni pred izkopom uporabite kombinacijo **Shirlan 500 SC** (0,3-0,4 L/ha) + **Reglone 200 SL** (2,5 L/ha). **Dessicash 200 SL**, se uporablja za sušenje krompirjevke na semenskem in jedilnem krompirju v odmerku 4L/ha (40 ml na 100 m<sup>2</sup>), vedno ob porabi vode 200-600 L/ha (2-6 L na 100 m<sup>2</sup>), odvisno od bujnosti krompirjevke. Za oba velja, da škropite v času, ko imajo gomolji zeleno debelino in čvrsto kožico, oziroma 14 dni preden se krompir izkoplje in skladišči. Karenca za Reglone 200 SL in Dessicash 200 SL je 10 dni!

OPOZORILO: Desikacijo je potrebno opraviti v jasnem, suhem in ne prevročem vremenu. Tla ne smejo biti zasičena z vlago!

***Pred uporabo FFS pozorno preberite priložena navodila za uporabo in opravite desikacijo v skladu s predpisanimi navodili!***

Na krompiriščih, kjer krompirjevko mehansko kosite, le to čim prej po košnji odstranite z njiv in počakajte z izkopom vsaj 14 dni, da kožica na krompirjevih gomoljih nekoliko otrdi.

Datum objave obvestila: 12.07.2018 14:17

Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Objavil/a: SILVO Zveplan

Pripravil: **Silvo Zveplan**

Seznam registriranih FFS