



49. OBVESTILO O VARSTVU OLJČNIKOV - 25.04.2019 10:44 - Zaključeno



**Pavje oko in oljkova siva pegavost**

V posameznih oljčnikih na celotne območju pridelave oljk opažamo močnejši pojav pavjega očesa. Oljkarje, katerih oljčnike je močno prizadela glivična **bolezen pavje oko ali oljkova siva pegavost**, obveščamo, da naj prizadeta drevesa pred pričetkom cvetenja še enkrat poškopirajo s fungicidom. Pri tem lahko uporabijo naslednje pripravke:

AKTIVNA SNOV	FFS	ODMEREK
- bakrov oksiklorid	<b>Cuprablau-Z 35 WG</b>	1,6-2 kg/ha
- bakrov oksiklorid	<b>Cuprablau-Z 35 WP</b>	2 kg/ha
- bakrov oksiklorid	<b>Cuprablau Z 50 WP</b>	1,4 kg/ha
- bakrov oksiklorid	<b>Cuprablau Z ultra WP</b>	1,8 kg/ha
- bakrov oksid	<b>Nordox 75 WG</b>	1,25 kg/ha
- folpet	<b>Folpan 50 SC</b>	3,2 l/ha
- dodin	<b>Syllit 400 SC</b>	2,25L/ha
- tebukonazol + trifloksistrobin	<b>Nativo 75 WG</b>	0,25 kg/ha
- difenkonazol	<b>Score 250 EC</b>	0,5 l/ha
- difenkonazol	<b>Mavita 250 EC</b>	0,5 l/ha

Pri ekološki pridelavi oljk je dovoljena le uporaba pripravkov na osnovi bakra.

Glavni znaki pavjega očesa so okrogle sive pege na listih in močno odpadanje listov v spodnjem delu krošnje. Na bolezen sta posebno občutljivi Istrska belica in Oblica.

Glavni znaki **oljkove sive pegavosti** so blaga sajavost na spodnji strani in rumenenje zgornje strani lista. Na bolezen so posebno občutljive italijanske sorte (Leccino, Lecone in Pendolino).

Bakreni pripravki delujejo proti obema boleznima, sočasno razkužijo pri rezi nastale rane in ovirajo razvoj bakterije, povzročiteljice **oljkovega raka**.

**Bodite pozorni na karenci pripravkov! Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!**

Datum objave obvestila: 25.04.2019 10:44

Obvestilo prognošičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: JANČAR Matjaž

Pripravil: **Matjaž Jančar**, tel.: 05 630 40 60

[Seznam registriranih FFS](#)

---



MKGP-UVHVR | FITO-INFO | NEOKS s.p. © 2014/20