



55. OBVESTILO O VARSTVU SOLATE - 30.04.2019 11:48 - Zaključeno



Solatna plesen

Zaradi deževnega vremena se na pridelovalnih površinah na prostem kot v zavarovanih prostorih lahko pojavi **solatna plesen**. Bolezen prepoznamo po belkasti prevleki, ki se razvije na spodnji strani listov. V rastlinjaku možnost za pojav bolezni zmanjšamo s prezračevanjem. Dodatno se priporoča tudi odstranjevanje obolelih rastlin. Zatiranje bolezni lahko opravimo s pripravki, ki so navedeni v spodnji preglednici.

| Sredstvo | Odmerek ali koncentracija |
|---------------------------|---|
| *Anylo-X | 1,5 – 2,5 l/ha |
| *Cuprablau Z 35 WG | 1,5 kg/ha |
| Enervin | 2 kg/ha |
| Gett | 2,5 kg/ha |
| Infito | 1,6 l/ha |
| Mirador 250 SC | 1 l/ha |
| Ortiva | 1 l/ha |
| Pergado MZ | 2,5 kg/ha |
| Polyram DF | 1,2 kg/ha |
| Previcur Energy | 2,5 l/ha (škropljenje v zavarovanem prostoru po presajanju) |
| Revus | 0,6 l/ha |
| Ridomil Gold MZ Pepite | 1,9-2,5 kg/ha |
| Zaftra AZT 250 SC | 1 l/ha |
| Zoxis 250 SC | 1 l/ha |

*Pripravka se lahko uporabljata v ekološki pridelavi.

Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Polži

Na pridelovalnih površinah se pojavljajo **polži**. Na vrtovih škodljivce odstranjujemo ročno ali pa uporabimo mehanske prepreke s katerimi onemogočimo dostop do gojenih rastlin. V okolici gredic lahko posipamo apno, ki izsuši telo polžev. Posipanje po dežju ponovimo. Dodatno lahko polže zatiramo tudi z uporabo limacidnih vab.

| Sredstvo | Odmerek ali koncentracija |
|---------------------------------|--|
| Agrosan B - polžomor | 7-10 kg/ha (70-100 g na 100 m ²) |
| Arion + | 7-10 kg/ha (70-100 g na 100 m ²) |
| Biotip vaba za polže | 4 kg/ha (40 g na 100 m ²); skupni odmerek v eni rastni dobi ne sme preseči 12 kg/ha (120 g na 100 m ²) |
| Carakol | 7-10 kg/ha (70-100 g na 100 m ²) |
| Celaflor Limex | 70 g/100 m ² |
| Compo Bio sredstvo proti polžem | 5 g/m ² |
| Ferramol | 5 g/m ² |

| | |
|-------------------------------|--|
| Ironmax Pro | 7 kg/ha (70 g na 100 m ²) |
| Kolfior | 7-10 kg/ha (70-100 g na 100 m ²) |
| Limaks | 7-10 kg/ha (70-100 g na 100 m ²) |
| Lima Gold 3 % | 7 kg/ha (70 g na 100 m ²); skupni odmerek v eni rastni dobi ne sme preseči 21 kg/ha (210 g na 100 m ²) |
| Medal | 7 kg/ha (70 g na 100 m ²); skupni odmerek v eni rastni dobi ne sme preseči 21 kg/ha (210 g na 100 m ²) |
| Metarex Inov | 5 kg/ha pri tretiranju po celotni površini in v vrsti; 4 kg/ha pri tretiranju v brazde ali ob setvi semena |
| Polžokill | 4 kg/ha (40 g na 100 m ²); skupni odmerek v eni rastni dobi ne sme preseči 12 kg/ha (120 g na 100 m ²) |
| Terminator vaba za polže | 7-10 kg/ha (70-100 g na 100 m ²) |
| Terminator Plus vaba za polže | 4 kg/ha (40 g na 100 m ²); skupni odmerek v eni rastni dobi ne sme preseči 12 kg/ha (120 g na 100 m ²) |

Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Datum objave obvestila: 30.04.2019 11:48

Obvestilo prognoističnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: Devetak Marko

Pripravil: **Marko Devetak**

[Seznam registriranih FFS](#)