

### 38. OBVESTILO O VARSTVU AMERIŠKIH BOROVRTIC - 06.05.2019 10:47 - Zaključeno



Ameriške borovnice so sedaj v fenološki fazi polnega cvetenja ali tik pred cvetenjem, odvisno od sorte. V tem obdobju je potrebno cvetove varovati pred sekundarnimi okužbami z **monilijo ameriških borovnic**. Nestanovitno vreme ustvarja ugodne razmere za okužbe. Pridelovalcem priporočamo, da redno izvajate varstvo borovnic med cvetenjem, z uporabo enega izmed fungicidov kot je **Folicur EW 250, Mavita 250 EC, Score 250 EC, Signum, Stroby WG, Switch 62,5 WG, Teldor SC 500** ali **Serenade ASO**. Slednji je dovoljen tudi v ekološki pridelavi.

**Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!**

Datum objave obvestila: 06.05.2019 10:47

Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: Matic Novljan

Pripravil: **Matic Novljan, Primož Žigon, Uredila: Meta Zemljič**

[Seznam registriranih FFS](#)