



**68. OBVESTILO O VARSTVU KROMPIRJA - 23.05.2019 08:05 - Zaključeno**



V Vipavski dolini zgodnji krompir začenja s cvetenjem, poznejši krompir pa je v fazi sklepanja vrst in bujne rasti. Vlažno in relativno toplo vreme nudijo izredno ugodne pogoje za širitev krompirjeve plesni. V nasadih opazamo tudi prisotnost črne noge na krompirju. V priloženem seznamu so navedeni registrirani fungicidi za varstvo krompirja pred krompirjevo plesnijo in črno listno pegavostjo krompirja. Pred uporabo fungicida obvezno preberite in upoštevajte **NAVODILO O UPORABI !**

V Vipavski dolini in Slovenski Istri so posevki krompirja v bujni fazi rasti. Zgodnje sorte že začenjajo s cvetenjem, kasnejše pa sklepajo vrste. Kasneje sajeni posevki poznih sort še niso sklenili vrst, zato je pri njih nevarnost pojava krompirjeve plesni nekoliko manjša. Obilica padavin in raznočena topla tla so tudi ugodni medij za razvoj bakterijskih bolezni krompirja. Opazili smo že prve okužbe s črno nogo. Črna noga se pojavi pred cvetenjem, ko cima začne rumeneti, če jo izruvamo pa opazimo črno propadlo steblo (nogo) v spodnjem delu, ki je v zemlji. Take rastline je potrebno skupaj z gomolji odstraniti iz njive. Črna noga se širi z okuženim semenom in proti njej ni zaščitnega sredstva. V višjih legah Primorske, kjer so noči še hladnejše in je krompir komaj vzkalil, nevarnosti za širitev krompirjeve plesni šeni. Priporočam vsem, da redno spremljate posevke in jih po potrebi zaščitite. Pri izkopu zgodnjega krompirja pazite na karenci!

Pripravila: Anka Poženeš, univ.dipl.inž.agr.

## FUNGICIDI V KROMPIRJU 2019

**KONTAKTNI OZ. DOTIKALNI FUNGICIDI** REGISTRIRANI ZA ZAŠČITO PRED KROMPIRJEVO PLESNIJO (*Phytophthora infestans*), 23.4.2019

PRIPRAVEK	AKTIVNA SNOV	ODMEREK	KARENCA	REGISTRIRAN ZA ALTERNARIO*
ANTRACOL = ANTRACOL WG 70	propineb 70%	2,5 kg/ha	14 dni	DA  Zaloge v uporabi do:  22.6.2019
DITHANE DG Neotec == MANKOZ 75 WG	mankozebl 75%	2 kg/ha	7 dni	DA
DITHANE M-45	mankozebl 80%	2 kg/ha	7 dni	DA
MANFIL PLUS 75 WG, MANFIL 75 WG	mankozebl 75%	2 kg/ha	7 dni	DA
MANFIL 80 WP == PINOZEB M-45	mankozebl 80%	2 kg/ha	7 dni	NE
PENCOZEB 75 DG	mankozebl 75%	1,7 kg/ha	7 dni	NE

<b>AVATAR 75 NT</b>	mankozeb 75%	<b>2 kg/ha</b>	7 dni	DA
<b>ENERVIN</b>	ametoktradin 12% + metiram 44%	<b>2 kg/ha</b>	7 dni	NE
<b>POLYRAM DF</b>	metiram 70%	<b>2 kg/ha</b>	21 dni	NE
<b>RANMAN TOP</b>	ciazofamid 16%	<b>0,5 l/ha</b>	7 dni	NE
<b>SHIRLAN 500 SC = WINBY = FROWNCIDE</b>	fluazinam 50%	<b>0,4 l/ha</b>	7 dni	NE

**SISTEMIČNI IN POLSISTEMIČNI FUNGICIDI REGISTRIRANI ZA ZAŠČITO PRED KROMPIRJEVO PLESNIJO (*Phytophthora infestans*),**  
23.4.2019

<b>PRIPRAVEK</b>	<b>AKTIVNA SNOV</b>	<b>ODMEREK</b>	<b>KARENCA</b>	<b>REGISTRIRAN ZA ALTERNARIO*</b>
<b>ACROBAT MZ WG == FORUM MZ WG</b>	dimetomorf 9% + mankozeb 60%	<b>2 kg/ha</b>	7 dni	<b>DA</b>
<b>ELECTIS 75 WG</b>	mankozeb 66,7% + zoksamid 8,3%	<b>1,5 - 1,8 kg/ha</b>	7 dni	NE
<b>GALBEN M</b>	benalaksil 8% + mankozeb 65%	<b>2,5 kg/ha</b>	28 dni	NE
<b>INFINITO</b>	fluopikolid 6,25 % + propamokarb 62,5 %	<b>1,2 - 1,6 l/ha</b>	7 dni	NE
<b>MELODY DUO WG 66,8</b>  Zaloge v uporabi do: 22.6.2019	iprovalikarb 5,5% +  propineb 61,3%	<b>2,5 kg/ha</b>	14 dni	NE
<b>ANTRACOL COMBI WP 62,8</b>  Zaloge v uporabi do: 22.6.2019	cimoksanil 4,8% + propineb 58%	<b>2,5 kg/ha</b>	14 dni	NE
<b>MOXIMATE 725 WG = MOXIMATE 725 WP == MOXIMATE PLUS == PROFILUX= CURZATE M 72,5 WG</b>	cimoksanil 4,5% + mankozeb 68%	<b>2,5 kg/ha</b>	7 dni	NE
<b>CURZATE C EXTRA</b>	baker v obliki bakrovega hidroksida 25% + cimoksanil 6%	<b>2 kg/ha</b>	28 dni	NE

<b>CYMBAL</b>	cimoksaniil 45%	<b>0,2 – 0,25 kg/ha</b>	7 dni	NE
<b>SACRON 45 DG</b>	cimoksaniil 45%	<b>0,22 kg/ha</b>	14 dni	NE
<b>NAUTILE DG</b>	cimoksaniil 5% + mankozeb 68%	<b>2 kg/ha</b>	7 dni	NE
<b>NAUTILE WP</b>	cimoksaniil 4,5% + mankozeb 65%	<b>2,25 kg/ha</b>	21 dni	NE
<b>EQUATION PRO</b>	cimoksaniil 30% + famoksadon 22,5%	<b>400 g/ha</b>	14 dni	NE
<b>BANJO FORTE</b> Datum veljavnosti: 31.7.2019	dimetomorf 20% + fluazinam 20%	<b>1 l/ha</b>	7 dni	NE
<b>ORVEGO</b> Datum veljavnosti: 31.7.2019	ametoktradin 30% + dimetomorf 22,5%	<b>0,8 l/ha</b>	7 dni	NE
<b>RIDOMIL GOLD MZ PEPITE</b>	mankozebe 64% + metalaksil-M 3,88%	<b>2,5 kg/ha</b>	21 dni	NE
<b>GETT == PERGADO MZ</b>	mandipropamid 5% + mankozeb 60%	<b>2,5 kg/ha</b>	7 dni	<b>DA</b>
<b>REVUS</b>	mandipropamid 25%	<b>0,4 - 0,6 l/ha</b>	3 dni	NE
<b>TANOS 50 WG</b> Datum veljavnosti: 30.6.2019	cimoksaniil 25% + famoksadon 25%	<b>0,7 kg/ha</b>	14 dni	NE
<b>CARIAL FLEX</b>	Cimoksaniil 18%+ Mandipropamid 25%	<b>0,6 kg/ha</b>	7 dni	NE
<b>COPFORCE EXTRA</b>	baker v obliki bakrovega hidroksida 30%+ cimoksaniil 6%	<b>2 kg/ha</b>	14 dni	NE
<b>CURZATE PARTNER</b>	Cimoksaniil 60%	<b>0,15 kg/ha</b>	1 dan	NE
<b>PROXANIL 450 SC</b> Datum veljavnosti:	Cimoksaniil 5%+ propamokarb hidroklorid 40%	<b>2-2,5 l/ha</b>	14 dni	NE

<b>31.7.2019</b>				
<b>REBOOT</b> Datum veljavnosti: 1.7.2019	Cimoksaniil 33%+ zoksamid 33%	<b>0,45 kg/ha</b>	7 dni	NE
<b>RIVAL DUO</b>	Cimoksaniil 5%+ Propamokarb hidroklorid 40%	<b>2,5 l/ha</b>	14 dni	NE
<b>DIFCOR 250 EC</b> Datum veljavnosti: 31.12.2019	Difenokonazol 25%	<b>0,5 l/ha</b>	14 dni	DA Ni reg. za krompirjevo plesen !
<b>MAVITA 250 EC</b> Datum veljavnosti: 31.12.2019	Difenokonazol 25%	<b>0,6 l/ha</b>	3 dni	DA Ni reg. za krompirjevo plesen !
<b>MIRADOR 250 SC= ORTIVA= ZAFTRA AZT 250 SC</b>	Azoksistrobin 25 %	<b>Bela noga 3l/ha Črna listna pegavost 0,5 l/ha</b>	7dni	<b>DA Ni reg. za krompirjevo plesen !</b>
<b>CHAMANE</b>	Azoksistrobin 25%	<b>0,5 l/ha</b> Proti rjavi koreninski gnilobi ob sajenju- <b>3l/ha</b>	Čas uporabe	DA <b>Ni reg. za krompirjevo plesen !</b>
<b>TAZER 250 SC</b>	azoksistrobin 25%	<b>0,5 l/ha</b>	7 dni	DA <b>Ni reg. za krompirjevo plesen !</b>
<b>SCORE 250 EC</b> Datum veljavnosti: 31.12.2019	difenokonazol 25%	<b>0,6 l/ha</b>	3dni	DA <b>Ni reg. za krompirjevo plesen !</b>
<b>SERCADIS PLUS</b> Datum veljavnosti: 31.12.2019	Difenokonazol 5%+ fluksapiroksad 7,5%	<b>0,75 l/ha</b>	7 dni	DA <b>Ni reg. za krompirjevo plesen !</b>

KONTAKTNI OZ. DOTIKALNI FUNGICIDI NA OSNOVO BAKRA REGISTRIRANI ZA ZAŠČITO PRED KROMPIRJEVO PLESNIJO  
(*Phytophthora infestans*), 23.4.2019

PRIPRAVEK	AKTIVNA SNOV	ODMEREK	KARENCA	REGISTRIRAN ZA ALTERNARIO
-----------	--------------	---------	---------	---------------------------------

<b>NORDOX 75 WG</b>	baker v obliki bakrovega oksida 75%	<b>1 kg/ha</b>	14 dni	DA Dovoljen za EKO pridelavo!
<b>CUPRABLAU Z 35 WP</b>	baker v obliki bakrovega oksiklorida 35%	<b>2,8 kg/ha</b>	14 dni	<b>DA</b> Dovoljen za EKO pridelavo!
<b>CUPRABLAU Z 35 WG</b>	baker v obliki bakrovega oksiklorida 35%	<b>2,1 kg/ha</b>	14 dni	DA Dovoljen za EKO pridelavo!
<b>BADGE WG</b>	baker kot bakrov oksiklorid 24,5% baker kot bakrov hidroksid 24,4 %	<b>3 kg/ha</b>	7dni	NE Dovoljen za EKO pridelavo!

\* **Alternaria solani** - črna listna pegavost krompirja

Pripravila: A. Poženel, univ. dipl. inž. agr.; KGZS, KGZ Nova Gorica, Kmetijska svetovalna služba;

Vir: Seznam registriranih fitofarmaceutskih sredstev na dan 23.4.2019, MKGP, URSVHVVR

Datum objave obvestila: 23.05.2019 08:05

Obvestilo prognozičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: Devetak Marko

Pripravil: **Marko Devetak**

[Seznam registriranih FFS](#)

