



52. OBVESTILO O VARSTVU VINOGRADOV št.6 - 29.05.2019 13:20 - Zaključeno



Vinska trta je trenutno na najbolj ugodnih legah in na sortah, ki so hitreje v razvoju (Chardonnay, Rumeni muškat, Rizvanec) dosegla fenološko fazo BBCH 18 - 19 (8 do 9 listov razprtih). Pri ostalih sortah je povprečna fenološka faza BBCH 16-17 (razprtih 6 – 7 listov).

Pogoste in obilne padavine so omogočile začetek novih primarnih okužb s **peronosporo vinske trte**, povzročile pa so tudi izpiranje škroplilne obloge kontaktnih pripravkov. Priporočamo, da se škropljenje opravi takoj po končanih padavinah, presledki med škropljenji pa naj ne bodo daljši kot 8-10 dni.

Za naslednje škropljenje priporočamo uporabo enega od kombiniranih pripravkov (sistemični oz. polsistemični + kontaktni) kot so: **Acrobat MZ WG** (2,5 kg/ha) ali **Alleato 80 WG** (2,5 kg/ha) ali **Alleato duo** (1-2 kg/ha) ali **Ampexio** (0,5 kg/ha) ali **Antracol combi WP 62,8** (2,5 kg/ha, zaloge v uporabi do 22.6.2019) ali **Curzate M 72,5 WG** (2,3 kg/ha) ali **Cymbal** (0,125 kg/ha) ali **Electis 75 WG** (1,5-1,8 kg/ha) ali **Emendo F** (1,5 kg/ha) ali **Enervin** (2,5 kg/ha) ali **Equation pro** (0,4 kg/ha) ali **Folpan Gold** (staro ime Ridomil gold combi pepite, 2kg/ha) ali **Forum MZ WG** (2,5 kg/ha) ali **Forum star** (1,6 kg/ha) ali **Gett** (2,5 kg/ha) ali **Melody duo WG 66,8** (2-2,5 kg/ha, zaloge v uporabi do 22.6.2019) ali **Mikal Flash** (4 kg/ha) ali **Mikal premium F** (3 kg/ha) ali **Momentum F** (4 kg/ha) ali **Momentum trio** (3kg/ha) ali **Moximate 725 WG** oz. **WP** (1,25 kg/ha) ali **Moximate plus** (1,25 kg/ha) ali **Nautil DG** (2,4 kg/ha) ali **Orvego** (0,8 L/ha) ali **Pergado F** (1,25 kg/ha) ali **Pergado D** (1,4 L/ha) ali **Pergado MZ** (2,5 kg/ha) ali **Profiler** (3 kg/ha) ali **Profilux** (1,25 kg/ha) ali **Revus** (0,6 l/ha) ali **Ridomil gold MZ Pepite** (2,5 kg/ha) ali **Sfinga Extra WDG** (1,5 kg/ha) ali **Tanos 50 WG** (0,4 kg/ha) ali **Twingo** (3 kg/ha) ali **Valis F** (1,5 kg/ha).

Uporabiti je mogoče tudi pripravka **LBG-01F34** ali **Soriale LX** v odmerku 4 L/ha (če se uporabljata samostojno) ali 3 L/ha (v kombinaciji z drugimi fungicidi na osnovi aktivnih snovi *folpet* ali *mankozeb*).

Mogoče je uporabiti tudi kontaktne pripravke s kurativnim delovanjem, kot so: **Daimyo F** (2,5 L/ha) ali **Mildicut** (2 L/ha) ali **Videryo F** (2,5 L/ha) ali **Vincy F** (2,5 L/ha).

Pripravkom **Alleato 80 WG**, **Cymbal**, **Equation pro**, **Profiler** in **Revus** priporočamo dodajanje enega od kontaktnih pripravkov v vsaj polovičnem odmerku.

Vremenske razmere za pojav **oidija vinske trte** trenutno niso najbolj ugodne, vendar se bo nevarnost za okužbo z otoplivitvijo vremena povečala.

V vinogradih, kjer se je v lanskem letu **oidij** močneje pojavljal, priporočamo v tem času uporabo pripravka: **Karathane Gold 350 EC** (0,5 l/ha) ali **Falcon EC 460** (0,4 L/ha). Uporabite lahko tudi enega od naslednjih pripravkov: **Baltazar** (0,4 L/ha) ali **Collis SC** (0,4 l/ha) ali **Crystal** (0,16 l/ha) ali **Dynali** (0,65 l/ha) ali **Folicur EW 250** (0,4 L/ha) ali **Kusabi 300 SC** (0,15 L/ha) ali **Luna experience** (0,375 l/ha) ali **Luna max** (1 l/ha) ali **Mavita** (0,2 l/ha) ali **Misha 20 EW** (0,23 l/ha) ali **Mystic 250 EC** (0,4 l/ha) ali **Nativo 75 WG** (0,16 kg/ha) ali **Orius 25 EW** (0,4 l/ha) ali **Postalon 90 SC** (1 do 1,25 l/ha) ali **Score 250 EC** (0,2 L/ha) ali **Sercadis** (0,15 L/ha) ali **Spirox D** (0,5 l/ha) ali **Star Tebukonazol** (0,4 l/ha) ali **Talendo** (0,25 l/ha) ali **Talendo extra** (0,08-0,2 l/ha) ali **Tebusha 25% EW** (0,4 L/ha) ali **Topas 100 EC** (0,3 l/ha) ali **Topaze** (0,3 l/ha) ali **Vivando** (0,16 l/ha).

Sredstvom za zatiranje **oidija** lahko dodate še enega od pripravkov na osnovi močljivega žvepla, kot so: **Cosan** ali **Kumulus DF** ali **Microthiol special** ali **Pepelin** ali **Thiovit jet** ali **Vindex 80 WG** v odmerku 3,0-8,0 kg/ha ali **Biotip Sulfo 800 SC** (4 L/ha) ali **Pol-Sulphur 80 WG, WP** (4 kg/ha) ali **Pol-Sulphur 800 SC** (4,0 L/ha) ali **Symbiotica fito – tekoče žveplo** (4,0 L/ha) ali **Symbiotica fito – granulirano žveplo** (4,0 kg/ha) ali **Cosinus** oziroma **Cosavet DF** ali **Močljivo žveplo Karsia DF** (8 kg/ha – v primeru pojava oidija).

V primeru pojava **neurij in toče** imajo pri zaščiti vinske trte prednost pripravki, ki vsebujejo a.s. folpet: (**Forum star**, **Sfinga extra WDG**, **Pergado F**, **Folpan Gold**, **Mikal flash**, **Mikal premium F** in podobni). V tem primeru priporočamo tudi dodajanje foliarnih gnojil kot so **Protifert LMW**, **Algoplasmin**, **Basfoliar aktiv** ali podobnih. Pred uporabo posameznih kombinacij pripravkov in foliarnih gnojil je potrebno v navodilih za uporabo preveriti mešanje zaradi morebitnega pojava fitotoksičnosti.

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda.

V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN

Datum objave obvestila: 29.05.2019 13:20

Obvestilo prognošičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Objavil/a: MEŠL Miro

Pripravil: **Miro Mešl**

[Seznam registriranih FFS](#)

