



## 64. VARSTVO KROMPIRJA - 10.06.2019 12:07 - Zaključeno



Z nastopom vročega in suhega vremena razmere za razvoj krompirjeve plesni niso več tako nevarne, saj se pri temperaturah nad 30 stopinj razvoj povzročitelja upočasni. V preteklem tednu smo pojave bolezni opažali v nekaterih zgodaj sajenih nasadih krompirja, predvsem na delih, ki so bili spomladi pokriti s prekrivko, pa tudi v nepokritih nasadih v okolici. Pregledujte nasade. Kjer boste v kratkem začeli z izkopavanjem zgodnjega krompirja zatiranje s fungicidi ni več smiselno. Če pa bo krompir na njivi še kak teden pa lahko še uporabite fungicid s kratko karenco, kot je npr. pripravek Revus (K=3 dni).

V poznejših sortah je potrebno nadaljevati z varstvom. V nasadih, ki sedaj hitro in bujno rastejo še naprej priporočamo rabo pripravkov s sistemskim ali delno-sistemskim delovanjem kot so **Infito, Proxanil 450 SC, Rival duoali Acrobat MZ WG, Forum MZ WG, Banjo forte, Orvego, Nautile, Moximate, Equation pro, Tanos 50 WG, Carial flex, Reboot, Pergado MZ, Gett, Revus in podobni** ali tudi **Ranmann** in **Enervin**.

Spremljajte tudi razvoj koloradskega hrošča, ki je v toplem vremenu zelo hiter. Insekticid uporabite zgodaj, ko so ličinke še majhne in bolj občutljive. Za zatiranje ličink koloradskega hrošča lahko uporabite katerega od pripravkov kot so **Alverde, Biscaya, Bulldock EC 25, Calypso SC 480, Coragen, Daskor 440, Evure, Mavrik 240, Mospilan 20 SG, Sparvierón** podobni. Actara z letošnjo sezono nima več dovoljenja za uporabo na prostem. Ekološki pridelovalci lahko uporabite pripravke **Raptol koncentrat, Laser 240 SC** ali **Laser plus** ter **Neemazal-T/S**.

**Upoštevajte sredstvom priložena navodila!**

Datum objave obvestila: 10.06.2019 12:07

Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: Meta Urbančič Zemljič

Pripravili: **Meta Urbančič Zemljič** in **Neja Marolt**

**Seznam registriranih FFS**

