



54. VARSTVO VINSKE TRTE - 12.06.2019 14:42 - Zaključeno



Vinska trta cveti (65 – 66 po lestvici BBCH).

Vinogradnikom svetujemo, da izkoristite toplo in suho vreme ter zaustavite aktivne okužbe s *peronosporo vinske trte*. Za varstvo uporabite kombinirane pripravke: **ACROBAT MZ WG** (2,5 kg/ha), **FORUM MZ WG** (2,5 kg/ha), **FORUM STAR** (1,6 kg/ha), **SFINGA EXTRA WDG** (1,5 kg/ha), **REBOOT** (0,4 kg/ha), **MOXIMATE 725 WG** (1,25 kg/ha), **MOXIMATE 725 WP** (1,25 kg/ha), **MOXIMATE PLUS** (1,25 kg/ha), **NAUTILE DG** (2,4 kg/ha), **PROFILUX** (1,25 kg/ha), **TANOS 50 WG** (0,4 kg/ha), **EQUATION PRO** (400 g/ha), **FOLPAN GOLD** (staro ime RIDOMIL GOLD COMBI PEPITE; 2,5 kg/ha), **ORVEGO** (0,8 l/ha), **ENERVIN** (2,5 kg/ha), **MILDICUT** (2 l/ha) ali **ELECTIS 75 WG** (1,5-1,8 kg/ha). Sistemsko delujoča pripravka na osnovi fosfonatov: **SORIALE LX** in **LBG-01F34** nanesete v odmerku 4 l/ha, če ju uporabite samostojno, oz. 3 l/ha v kombinaciji s fungicidi na osnovi aktivnih snovi folpet ali mankozeb. **DELAN PRO** (3 l/ha) kot kombinacija fosfonatov in ditanona deluje podobno. S sredstvi na osnovi aktivne snovi foseetil aluminij je potrebno nanos opraviti 3 × zaporedoma, v razmiku 8-10 dni (prilagodite intenzivnosti rasti). Uporabite lahko: **MIKAL PREMIUM F** (3 kg/ha) ali **MOMENTUM TRIO** (3 kg/ha) ali **MAGMA TRIPLE WG** (3 kg/ha), oz. preventivno: **MIKAL FLASH** (4 kg/ha), **MOMENTUM F** (4 kg/ha), **ALLEATO DUO** (1-2 kg/ha).

Nevarnost okužb z *oidijem vinske trte* ostaja. Izpostavljeni so kabrniki, katere je potrebno zaščititi s pripravkom: **SERCADIS** (0,15 l/ha), **MYSTIC 250 EC** (0,4 l/ha), **MAVITA250 EC** (0,2 l/ha), **BALTAZAR** (0,4 l/ha), **LUNA EXPERIENCE** (0,375 l/ha), **LUNA MAX** (1 l/ha), **KUSABI 300 SC** (0,15 l/ha), **FALCON EC 460** (0,4 l/ha) ali **KARATHANE GOLD 350 EC** (0,5 l/ha),...

Upoštevajte, da visoke temperature ovirajo nanos in učinkovitost fitofarmaceutskih sredstev. V kombinaciji s spodbujevalci rasti in listnimi gnojili **lahko pride do pojavov fitotoksičnosti**. Zaščito vinogradov opravite v večernem času, ko so temperature nižje in se izognete zanašanju. Razmike med tretiranjimi prilagodite intenzivnosti priraščanja in morebitnim padavinam (ko pade več kot 30 mm, je zaščitna obloga že oslABLJENA), oz. na 7 - 8 dni.

V primeru neurja s točo opravite varstvo vinograda čim prej, a počakajte, da se listje osuši. Pri izbiri pripravkov dajte prednost sredstvom z aktivno snovjo folpet: **FOLPAN 50 SC**, **FOLPAN 80 WDG**, **FOLLOW 80 WG** ali katerim drugim kombiniranim pripravkom z a.s. folpet.

Prve izglele ličinke **ameriškega škržatka** smo letos zabeležili 31.05.2019. O pravilni izvedbi varstva pred prenašalcem **zlate trsne rumenice** vas bomo pravočasno obvestili.

V primeru rabe sredstev, ki so čebelam nevarna, pokosite cvetočo podrast in jih uporabite v večernem času, ko čebele ne letajo. Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 12.06.2019 14:42

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

[Seznam registriranih FFS](#)