

## 60. OBVESTILO O VARSTVU VINSKE TRTE - 08.07.2019 10:21 - Zaključeno



V vinogradih je potrebno še naprej izvajati preventivne varstvene ukrepe za preprečevanje novih okužb in širjenja glivičnih bolezni. Nanos fungicidov je potrebno ponoviti najkasneje po 10 dneh od prejšnjega škropljenja oziroma prej, če je vmes padlo več kot 30 mm dežja. Pred okužbami s **peronosporo** je potrebno zavarovati predvsem mlade liste na vrhovih in zalistnikih, Razvijajoče grozde je potrebno zavarovati pred **oidijem**. Pogoste plohe in nevihte omogočajo hiter prirast zelenih delov rastlin ter intenzivno spiranje škroplilne obloge, zato za naslednje škropljenje še vedno priporočamo uporabo fungicidov s kombiniranim kontaktnim in sistemskim oz. polysistemskim načinom delovanja, ki smo jih navedli v prejšnjih obvestilih.

Pri sortah, ki so hitreje v razvoju in grozdiki že prehajajo v razvojno fazo BBCH 77 (začetek dotikanja jagod) je priporočljivo opraviti škropljenje proti **sivi grozdi plesni – botritisu**. Uporabite lahko katerega od za ta namen registriranih pripravkov oz. botriticidov kot so **Cantus, Mythos, Prolectus, Pyrus 400 SC, Scala, Switch 62,5 WG** ali **Teldor SC 500**. Uporabite lahko tudi pripravke: **Amylo-X, Botector** ali **Serenade ASO** (le za namizno grozdje). Slednji so dovoljeni tudi v ekološki pridelavi. Zaradi boljšega nanosa in s tem večje učinkovitosti delovanja pripravkov, je potrebno škropljenje opraviti preden se jagode strnejo v grozde. Nanos botriticidov lahko opravite le v območju grozdov in temu ustrezno prilagodite tudi odmerek pripravkov ter količino vode.

**Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!**

Datum objave obvestila: 08.07.2019 10:21

Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: Matic Novljan

Pripravil: **Matic Novljan, Primož Žigon, Uredila: Meta Zemljič**

[Seznam registriranih FFS](#)

