



Osrednja Slovenija - Kmetijski inštitut Slovenije / Ostalo

/ 101. Priporočila za varstvo strniščne repe, črne redkve, rumene kolerabe in kitajskega zelja

101. Priporočila za varstvo strniščne repe, črne redkve, rumene kolerabe in kitajskega zelja - 28.08.2019 12:25 - Zaključeno



V začetnem obdobju rasti največ škode povzročajo **bolhači**. Objedajo mlade, razvijajoče se lističe, ga naluknjajo in s tem ovirajo rast rastlin. Žuželkam zelo odgovarja suho in toplo vreme, zato je v takih razmerah nevarnost za nastanek škod večja. Potrebno je redno pregledovanje posevkov in pravočasno ukrepanje v primeru napada.

Zelo nevaren škodljivec je tudi **repna grizlica**. V posameznih letih oz. lokacijah se lahko pojavi v zelo velikih populacijah. Osice spoznamo po rumenem do oranžnem zadku, ličinke (pagosenice) pa so najprej sivo zelene, starejše pa skoraj črne in do 2 cm dolge. Mlade pagosenice izjedajo luknje v liste, starejše so zelo požrešne in lahko v kratkem času pojedjo liste vse do žil. Napadene rastline so tudi onesnažene z iztrebki. Potrebno je natančno pregledovanje rastlin, ker so mlade ličinke težje opazne. Preglede izvajamo enkrat tedensko, prag zatiranja je dosežen, če najdemo v povprečju 1 ličinko na rastlino. Repna grizlica napada tudi ogrščico in nekatere sorodne plevele. Ob pregledu nekaterih posevkov repe na območju osrednje Slovenije in Gorenjske smo na posevkih opazili le odrasle grizlice, ličink pa še ne. Poleg repne grizlice lahko omenjene kulture napadejo tudi ličinke različnih metuljev (**gosenice sovč**) in **listne uši**.

V hladnih in deževnih jesenih se na listih rade pojavijo tudi **pegavosti**, ki jih povzročajo glive iz rodu *Alternaria* ali *Cercospora*. Kadar so prizadeti pretežno starejši listi, bolezni ne povzročijo posebne škode in zatiranje ni potrebno. V primeru močnejših okužb, zlasti v vlažnejših in zaprtih legah, ko se pege pojavljajo tudi na mlajših listih, je potrebno preprečiti širjenje bolezni s fungicidom, predvsem, če so rastline ob pojavu peg še majhne.

Za zatiranje škodljivcev in bolezni na repi, kolerabi, redkvi in kitajskem zelju so registrirani nekateri pripravki, ki so navedeni v spodnji tabeli.

Pred uporabo pozorno preberite in dosledno upoštevajte priložena navodila!

Insekticid	Zatiranje; št. tretiranj	Odmerek	Karenca
		L, kg/ha	dni
Coragen	metulji (ČR, RK, SR); največ 2-krat	0,175	21
Decis 100 EC	bolhači (RK, SR); največ 1-krat	0,063	30
	metulji (RK, SR); največ 1-krat	0,075	
Karate zeon 5CS	grizoče žuželke (SR, KK); največ 1-krat kapusov belin, kap. sovka, l. uši (SR); 1-krat sesajoče žuž. (SR, KK); 1-krat bolhači (KK); 1-krat	0,15	14
Lepinox plus	bombažna sovka, južna plodovrtka, kapusov molj (KK, ČR, SR); 3-krat	1,0	ni potrebna
Fungicid			
Sercadis plus	bela gniloba, črna l. pegavost, pepelovke (ČR, RK, SR); 1 do 2-krat	0,6-1,0	7
Serenade aso	Bela gniloba, črna listna pegavost (RK, SR); 6-krat	8,0	ni potrebna

ČR-črna redkev; RK-rumena koleraba; SR-strniščna repa; KK-kitajski kapus

Datum objave obvestila: 28.08.2019 12:25

Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: Meta Urbančič Zemljič

Pripravili: **Meta Urbančič Zemljič** in Neja Marolt

Seznam registriranih FFS



MKGP-UJVHVR | FITO-INFO | NEOKS s.p. © 2014/20