



131. OBVESTILO O VARSTVU KOŠČIČARJEV - 10.10.2019 11:05 - Zaključeno



Breskov rak in ožig breskove skorje

Bolezni lesa kot so **breskov rak** in **ožig breskove skorje** se praviloma pojavljajo v starejših nasadih koščičarjev, lahko pa prizadenejo tudi mlajša drevesa. Glavna bolezenska znamenja so sušenje in smoljenje vej.

Za zatiranje bolezni v sadovnjakih breskev in sliv priporočamo uporabo sistemčnega pripravka **Topsin-M** v največjem dovoljenem odmerku 1,7 kg/ha (17 g na 100 m²). Z omenjenim sredstvom lahko na isti površini škropimo le enkrat na sezono.

V nasadih breskev in nektarin, marelic, češenj in višenj, na slivah in mandljih lahko breskovega raka in ožig breskove skorje zatiramo z izdelkom **Delan 700 WG**. Sredstvo uporabimo v odmerku 0,75 kg/ha. Na isti površini lahko škropimo največ dvakrat letno.

Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Datum objave obvestila: 10.10.2019 11:05

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: Devetak Marko

Pripravil: **Marko Devetak**

[Seznam registriranih FFS](#)

