



136. OBVESTILO O VARSTVU KAKIJA - 12.11.2019 09:07 - Zaključeno



V letošnjem letu smo v posameznih nasadih kakija na območju slovenske Istre in v spodnji Vipavski dolini potrdili prisotnost glive *Plurivorosphaerella nawae*, ki povzroča **kakijevo listno pegavost**. Bolezen prepoznamo po rjavih listnih pegah s poudarjenim temnim robom, ki se pojavijo v avgustu in septembru. Okrog peg se razvije klorotičen prstan, listi pa postopoma rumenijo in odpadajo. Kot zelo občutljiva se je izkazala sorta '*Rojo brillante*'.

Gliva prezimi na odpadlem listju v obliki trosišč (pseudotecijev). Spomladi ob ugodnih pogojih pride do izbruha aksospor, ki povzročajo okužbe. Pojav bolezni v naslednjem letu lahko omejimo z odstranjevanjem odpadlega listja iz nasada. Liste uničimo s kompostiranjem ali s sežigom.

Datum objave obvestila: 12.11.2019 09:07

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: Devetak Marko

Pripravil: **Marko Devetak**

[Seznam registriranih FFS](#)

