

5. OBVESTILO O VARSTVU BRESKEV IN NEKTARIN - 21.02.2020 14:33 - Zaključeno



**Breskova kodravost (*Taphrina deformans*) in listna luknjičavost koščičarjev (*Stigmina carpophila*)**

Na izpostavljenih legah so zgodnje sorte breskev in nektarin v fenofazi C - D po Baggoliniju ali 55 – 57 po BBCH lestvici (črašni listi odprti). V omenjenih nasadih za zatiranje **breskove kodravosti** lahko uporabite pripravka **Syllit 400 SC** v odmerku 2,25 l/ha ali **Syllit 544 SC** v odmerku 1,65 l/ha.

V sadovnjakih, kjer so brsti še zaprti in še niste škropili proti **breskovi kodravosti** in **listni luknjičavosti koščičarjev**, lahko še vedno uporabite **bakrove pripravke**.

Sredstvo	Odmerek ali koncentracija
Badge WG	3,5 kg/ha
Cuprablau Z 35 WG	1,6-2 kg/ha
Cuprablau Z 35 WP	3 kg/ha
Cuprablau Z Ultra WP	1,8 kg/ha
Nordox 75 WG	2 kg/ha

**Škropimo v toplem vremenu, ko ni vetra in je zračna vlaga nad 60 %. Pri škropljenju bodite pozorni, da zajamete tudi vrhove krošenj. Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!**

Datum objave obvestila: 21.02.2020 14:33

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: Devetak Marko

Pripravil: **Marko Devetak**

[Seznam registriranih FFS](#)

