

8. OBVESTILO O VARSTVU ČEŠENJ IN VIŠENJ - 27.02.2020 10:11 - Zaključeno



Listna luknjičavost koščičarjev (*Stigmina carpophila*)

Na izpostavljenih legah so brsti zgodnjih sort češenj in višenj močno napeti oz. v fenofazi B po Baggioliniju ali 01 po BBCH lestvici. Za zatiranje **listne luknjičavosti koščičarjev** lahko uporabite registrirane pripravke na osnovi **bakra** kot so:

Sredstvo	Odmerek ali koncentracija
Badge WG	3,5 kg/ha
Champion 50 WG	2 - 3 kg/ha
Cuprablau Z 35 WG	1,6 - 2 kg/ha
Cuprablau Z 35 WP	2 kg/ha

Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja! Škropljenje naj bo temeljito, pozorni bodite tudi na vrhove dreves.

Datum objave obvestila: 27.02.2020 10:11

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: Devetak Marko

Pripravil: **Marko Devetak**

[Seznam registriranih FFS](#)

