

#### 4. VARSTVO MARELIC - 06.03.2020 13:42 - Zaključeno



Marellice vstopajo v cvetenje (61- 63 po lestvici BBCH).

Ob začetku cvetenja, ko bo odprtih 10 % cvetov, je potrebno v nasadih marelic poskrbeti za varstvo pred **cvetno monilijo**. Uporabite lahko: **AMYLO-X** (1,5 – 2,5 kg/ha; tudi za ekološko pridelavo), **CHORUS 50 WG** (0,5 kg/ha), **DUAXO KONCENTRAT** (1,1 l/ha na meter višine krošnje, oz. največ 3,3 l/ha), **PROLECTUS** (največ 1 kg/ha, oz. 10 g / 100 m<sup>2</sup>), **SERENADE ASO** (8 l/ha; tudi za ekološko pridelavo), **SIGNUM** (0,25 kg/ha na meter višine krošnje, oz. največ 0,75 kg/ha), ali **SWITCH 62,5 WG** (0,08 % konc., največ 1 kg/ha).

Zaščito boste ponovili ob zaključevanju cvetenja, ko bodo odpadali venčni listki.

**Za kvalitetnejši nanos poskrbite, da se aplikacija izvaja v mirnem vremenu. Priporočamo, da jo opravite v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele (navedena sredstva sicer niso nevarna za čebele). Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.**

Datum objave obvestila: 06.03.2020 13:42

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

[Seznam registriranih FFS](#)

