



## 5. VARSTVO ČEŠENJ, VIŠENJ IN SLIV - 06.03.2020 13:44 - Zaključeno



Češnje, višnje in slive so v razvojni stopnji nabrekanja cvetnih brstov (51-54 po lestvici BBCH).

V nasadih češenj, višenj in sliv svetujemo pred začetkom razpiranja brstov preventivno zaščito z bakrovimi pripravki. Slednji učinkujejo na različna glivična in bakterijska obolenja. Proti **listni luknjičavosti koščičarjev** delujejo **BADGE WG** (3,5 kg/ha; tudi proti češpljevi metličavosti, oz. rožičavosti češpelj), **CUPRABLAU Z 35 WG** (1,6 – 2 kg/ha; tudi proti češnjevi listni pegavosti in raznim ožigom), **CUPRABLAU Z 35 WP** (2 kg/ha), **CHAMPION 50 WG** (2 – 3 kg/ha; tudi proti raznim ožigom in češpljevi metličavosti, oz. rožičavosti češpelj).

**Za kvalitetnejši nanos poskrbite, da se aplikacija izvaja v mirnem vremenu. Priporočamo, da jo opravite v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele (navedena sredstva sicer niso nevarna za čebele). Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.**

Datum objave obvestila: 06.03.2020 13:44

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

[Seznam registriranih FFS](#)