

11. OBVESTILO O VARSTVU MARELIC - 06.03.2020 14:14 - Zaključeno



**Cvetna monilija (*Monilinia laxa*)**

Zgodnje sorte marelic cvetijo (fenofaze 61-64 po BBCH ali E-F po Baggioliniju). Nasade je priporočljivo škropiti proti **cvetni moniliji**. Za zatiranje bolezni lahko uporabite registrirane pripravke, ki so navedeni v spodnji preglednici.

| Sredstvo         | Odmerek ali koncentracija   |
|------------------|---|
| Amylo-X          | 1,5 - 2,5 kg/ha   |
| Chorus 50 WG     | 0,5 kg/ha   |
| Duaxo koncentrat | V odmerku 15 ml/5l vode oziroma v odmerku 1,1 l na višinski meter krošnje/ha. Najvišji dovoljeni odmerek pri enem tretiranju ne sme presežati 3,3 l/ha. |
| Prolectus        | 330 g sredstva na višinski meter krošnje na hektar, pri čemer skupen odmerek sredstva pri enem tretiranju ne sme preseči 1 kg/ha                        |
| Serenade Aso     | 8 l/ha  |
| Signum           | 0,25 kg/ha na m višine krošnje; najvišji skupni odmerek ne sme presežati 0,75 kg/ha   |
| Switch 62,5 WG   | 0,08%; odmerek posameznega škropljenja ne sme preseči 1 kg/ha   |

**Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!**

Datum objave obvestila: 06.03.2020 14:14

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: Devetak Marko

Pripravil: **Marko Devetak**

Seznam registriranih FFS