



Celjska in Koroška regija - Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije / Pečkarji  
/ 7. Spremljanje razvoja jablanovega cvetožerja

## 7. Spremljanje razvoja jablanovega cvetožerja - 10.03.2020 13:19 - Zaključeno



Na območju Celjske regije so jabolane v povprečju na opazovane sorte v fenološki fazi B (BBCH 52). Na lokacijah, kjer ste v preteklem letu imeli težave z obvladovanjem **jablanovega cvetožerja** bodite pozorni na njegovo prisotnost. Pri sortah, ki so hitrejšje v razvoju (Carjevič, Summerred...) in kjer je že prisoten delež brstov, ki prehajajo v fenološko fazo C (BBCH 53) smo med 9. in 10.3. našli prve vbode brstov (% št. nabodenih brstov =5%) in prva odložena jajčeca (% št. odloženih jajčec 1,5%). Trenutno je še delež sort in brstov, primernih za vbode ter odlaganje jajčec majhen. Ob dvigu temperatur v teh dneh lahko pričakujemo hitrejši fenološki razvoj brstov vseh sort kakor tudi večjo aktivnost hroščkov. Zato izvajajte preglede brstov oziroma se poslužujte metode stresanja »točenja« vej.

**Prag škodljivosti je presežen, ko najdete v nasadih z manjšim cvetnim nastavkom več kot 15 % nabodenih brstov in več kot 30 % nabodenih brstov, v nasadih z močnejšim cvetnim nastavkom oziroma je več kot 15 % pregledanih brstov z odloženimi jajčeci. Pri metodi stresanja pa je prag presežen, če ulovimo na 100 vej 20 do 30 hroščkov ali več.**

O nadaljevanju razvoja jablanovega cvetožerja, preseganju praga škodljivosti in optimalnem času zatiranja vas bomo obveščali.

Datum objave obvestila: 10.03.2020 13:19

Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus

Pripravila: **Alenka Ferlež-Rus**

[Seznam registriranih FFS](#)

