



22. OBVESTILO O VARSTVU SLIV IN ČEŠPELJ - 19.03.2020 10:32 - Zaključeno



Listna luknjičavost koščičarjev (*Stigmina carpophila*)

Nasadi sliv in češpelj so v različnih fenoloških fazah. V nasadih, kjer drevesa brstijo je potrebno škropiti proti **listni luknjičavosti koščičarjev**. Za zatiranje bolezni je dovoljena uporaba **registriranih bakrovih sredstev**.

Sredstvo	Odmerek ali koncentracija
Badge WG	3,5 kg/ha
Champion 50 WG	2 - 3 kg/ha
Cuprablau Z 35 WG	1,6 - 2 kg/ha
Cuprablau Z 35 WP	2 kg/ha

Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja! Škropljenje naj bo temeljito, pozorni bodite tudi na vrhove dreves.

Cvetna monilija (*Monilinia laxa*)

Cvetoče sadovnjake (BBCH 60-65 ali E-F po Baggioliniju) je priporočljivo škropiti proti **cvetni moniliji**.

Sredstva registrirana za zatiranje cvetne monilije na slivah in češpljah:

Sredstvo	Odmerek ali koncentracija
Anylo-X	1,5 - 2,5 kg/ha
Chorus 50 WG	0,5 kg/ha
Luna Experience	0,6 l/ha (0,2 l na 1m višine krošnje na ha)
Prolectus	330 g sredstva na višinski meter krošnje na hektar; maksimalni odmerek 1 kg/ha
Serenade Aso	8 l/ha
Signum	0,25 kg/ha na m višine krošnje; maksimalni odmerek 0,75 kg/ha
Switch 62,5 WG	0,08%; maksimalni odmerek 1 kg/ha
Zenby	0,9 l/ha

Pazite na varstvo čebel. Omenjena sredstva sicer niso strupena za čebele, priporočamo pa, da zaradi morebitnega odvračalnega učinka z njimi škropite v večernem času, ko na cvetovih ni čebel. Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Rumena češpljeva grizlica (*Hoplocampa flava*) in črna češpljeva grizlica (*Hoplocampa minuta*)

V Brkinih so pozne sorte sliv in češpelj v fenofazi C po Baggioliniju ali 51 po BBCH lestvici. Za spremljanje **češpljevih grizlic** je v nasade smiselno obesiti bele lepljive plošče. Na hektar sadovnjaka potrebujemo dve lepljivi plošči (35 x 20 cm) katere pregledamo **takoj po končanem cvetenju**. Prag škodljivosti za zatiranje češpljevih grizlic je presežen, če se na bele lepljive plošče skupno ulovi več kot 30 osic.

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: Devetak Marko

Pripravil: **Marko Devetak**

[Seznam registriranih FFS](#)



MKGP-UVHVR | FITO-INFO | NEOKS s.p. © 2014/20