



23. OBVESTILO O VARSTVU ČEŠENJ IN VIŠENJ - 27.03.2020 10:55 - Zaključeno



**Cvetna monilija (*Monilinia laxa*)**

Nasadi zgodnjih sort češenj in višenj začenjajo cveteti (fenofaza 60 BBCH ali E po Baggioliniju). Ko bo odprtih 10 % cvetov je potrebno opraviti škropljenje proti **cvetni moniliji**. Za zatiranje bolezni lahko uporabite registrirane pripravke, ki so navedeni v spodnji preglednici.

| Sredstvo         | Odmerek ali koncentracija   |
|------------------|---|
| Amylo-X          | 1,5 - 2,5 kg/ha   |
| Duaxo koncentrat | V odmerku 15 ml/5l vode oziroma v odmerku 1,1 l na višinski meter krošnje/ha. Najvišji dovoljeni odmerek pri enem tretiranju ne sme presegati 3,3 l/ha. |
| Luna experience  | 0,6 l/ha (0,2 l na 1m višine krošnje na ha)   |
| Prolectus        | 330 g sredstva na višinski meter krošnje na hektar, pri čemer skupen odmerek sredstva pri enem tretiranju ne sme preseči 1 kg/ha                        |
| Serenade Aso     | 8 l/ha  |
| Signum           | 0,25 kg/ha na m višine krošnje; najvišji skupni odmerek ne sme presegati 0,75 kg/ha   |
| Switch 62,5 WG   | 0,08%; odmerek posameznega škropljenja ne sme preseči 1 kg/ha   |
| Teldor SC 500    | 0,5 l/ha na 1 m višine krošnje na ha (največji skupni odmerek 1,5 l na ha)  |
| Zenby            | 0,9 l/ha  |

**Pazite na varstvo čebel. Omenjena sredstva sicer niso strupena za čebele, priporočamo pa, da zaradi morebitnega odvrčalnega učinka z njimi škropite v večernem času, ko na cvetovih ni čebel. Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!**

Datum objave obvestila: 27.03.2020 10:55

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: Devetak Marko

Pripravil: **Marko Devetak**

[Seznam registriranih FFS](#)