

19. VARSTVO OREHOV - 08.04.2020 08:15 - Zaključeno



V času brstenja orehov je smiselno opraviti zaščitno tretiranje pred bakterijskim povzročiteljem boleznim *Xanthomonas* spp. in *Pseudomonas* spp.. Uporabite lahko bakrove pripravke: **CUPRABLAU Z 35 WG** (1,6 – 1,7 kg/ha), **CUPRABLAU Z 35 WP** (2 kg/ha), **CUPRABLAU Z 50 WP** (2,4 kg/ha) ali **CUPRABLAU Z UKTRA WP** (3,1 kg/ha).

Nanos opravite v mirnem vremenu, v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo čebelam nevarnih pripravkov odstranite cvetočo podrast in poskrbite vse za njihovo zaščito. Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 08.04.2020 08:15

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

[Seznam registriranih FFS](#)