



32. OBVESTILO O VARSTVU MARELIC - 17.04.2020 12:13 - Zaključeno



Marelična pepelovka

Marelice so v fenofazi 72-73 po BBCH lestvici oz. I-J po Baggioliniju. Sedaj lahko opravimo škropljenje proti **marelični pepelovki**. V omenjeni fenološki fazi se priporoča uporabo sredstev na osnovi **žvepla**.

Pripravki registrirani za zatiranje marelične pepelovke:

Sredstvo	Odmerek ali koncentracija
Biotip Sulfo 800 SC	6 l/ha
Cosan	5-7,5 kg/ha
Kumulus DF	5-7,5 kg/ha
Microthiol Special	5-7,5 kg/ha
Pepelin	5-7,5 kg/ha
Score 250 EC	0,03 %, najvišji odmerek 0,45 l/ha
Sercadis	0,15 l/ha
Thiovit Jet	5-7,5 kg/ha
Vindex 80 WG	5-7,5 kg/ha

Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Listne uši

V nasadih marelic spremljamo prisotnost **listnih uši**. Za zatiranje škodljivcev lahko uporabimo sredstvo **Calypso SC 480** v 0,02 % koncentraciji oz. največjem dovoljenem odmerku 0,3 l/ha ali pripravek **Mospilan 20 SG** v 0,025 – 0,04 % koncentraciji.

Pripravka sta čebelarjem nevarna zato je treba pred uporabo odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Datum objave obvestila: 17.04.2020 12:13

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: Devetak Marko

Pripravil: **Marko Devetak**

[Seznam registriranih FFS](#)

