

33. OBVESTILO O VARSTVU ČEŠENJ IN VIŠENJ - 17.04.2020 12:21 - Zaključeno



Mali zimski pedic

V nasadih češenj se lahko pojavijo gosenice **malega zimskega pedica**, ki se prehranjujejo z listi. Za zatiranje ličink malega zimskega pedica na koščičastem sadju je dovoljena uporaba pripravka **Agree WG** v odmerku 1 kg/ha. Za boljšo učinkovitost se priporoča, da se škropljenje ponovi v časovnem intervalu 7 dni.

Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Črna češnjeva uš

Takoj po končanem cvetenju je v nasadih češenj in višenj priporočljivo spremljati pojav **listnih uši**. Zatiranje **črne češnjeve uši** se priporoča, ko je napadenih več kot 3 % poganjkov. Za škropljenje češenj in višenj lahko uporabite pripravka **Calypso SC 480** v 0,025 % koncentraciji oz. v največjem dovoljenem odmerku 0,375 l/ha ali **Movento SC 100** v odmerku 1,5 l/ha.

Pripravka sta čebelam nevarna zato je treba pred uporabo odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Datum objave obvestila: 17.04.2020 12:21

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: Devetak Marko

Pripravil: **Marko Devetak**

[Seznam registriranih FFS](#)

